

Options thérapeutiques dans la dysfonction érectile

Les inhibiteurs de PDE5

Les inhibiteurs de PDE5 sont des médicaments sous ordonnance qui améliorent l'érection naturelle. Il en existe différentes préparations qui diffèrent par leur efficacité, leur durée d'action et leurs effets secondaires.

ATTENTION : ne prenez JAMAIS ces médicaments sans en parler d'abord à votre médecin et achetez-les uniquement en pharmacie !

Options thérapeutiques dans la dysfonction érectile

Médicaments intra-urétraux

Un petit comprimé est inséré dans le méat urinaire et déclenche une érection.

Options thérapeutiques dans la dysfonction érectile

Injection intracaverneuse

L'érection est déclenchée, malgré l'absence d'influx nerveux, par une substance produite par le corps, que vous-même ou votre partenaire pouvez injecter directement dans la verge (à la base du pénis) au moyen d'une aiguille très fine. L'effet commence après 10 à 25 minutes et dure environ une demi-heure.

L'injection intracaverneuse fonctionne également lorsque les problèmes érectiles proviennent de lésions nerveuses causées par l'ablation de la prostate.

Options thérapeutiques dans la dysfonction érectile

Pompe à vide

Une pompe est utilisée pour créer du vide dans un cylindre spécial qui fait gonfler le pénis. Un anneau pénien permet de maintenir l'érection pendant un certain temps en empêchant l'évacuation sanguine (pas plus de 30 minutes pour éviter les lésions).

Options thérapeutiques dans la dysfonction érectile

Implant pénien

Si aucune de ces approches ne suffit à rétablir vos érections pour que votre sexualité redevienne satisfaisante, parlez à votre urologue de la possibilité d'un implant pénien.