

Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Enfamil NeuroPro™ EnfaCare®



Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en la lata para medir el polvo.



✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	5 onzas líquidas	+	2 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas sin compactar + 1 cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	11 onzas líquidas		5 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas sin compactar

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas sin compactar. La fórmula en polvo Enfamil NeuroPro EnfaCare debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa sin compactar**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.



Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Enfamil NeuroPro™ EnfaCare®



Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna

con Fórmula para Bebés Enfamil NeuroPro EnfaCare

El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Enfamil NeuroPro EnfaCare a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso de la lata.



✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	2 onzas líquidas	+	½ cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	1 cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	1 cucharadita (cdta) + ½ cucharadita (cdta)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en la lata para medir el polvo.



✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	2 onzas líquidas	+	1 cuchara dosificadora (usando el scoop) rasa sin compactar

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas sin compactar. La fórmula en polvo Enfamil NeuroPro EnfaCare debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa sin compactar**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.



Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Enfamil NeuroPro™ EnfaCare®



Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna

con Fórmula para Bebés Enfamil NeuroPro EnfaCare

El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Enfamil NeuroPro EnfaCare a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso de la lata.

PREPARACIÓN

24 Calorías por onza líquida:

✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	1 cucharadita (cdta) + ½ cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	2 cucharaditas (cdtas) + ½ cucharadita (cdta)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en la lata para medir el polvo.

PREPARACIÓN

24 Calorías por onza líquida:

✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	9 onzas líquidas	+	5 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas sin compactar

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas sin compactar. La fórmula en polvo Enfamil NeuroPro EnfaCare debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa sin compactar**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.



Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Enfamil NeuroPro™ EnfaCare®



Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna

con Fórmula para Bebés Enfamil NeuroPro EnfaCare

El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Enfamil NeuroPro EnfaCare a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso de la lata.



✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	2 onzas líquidas	+	1 cucharadita (cdta) + ½ cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	1 cucharada (cda)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	1 cucharada (cda) + 1 cucharadita (cdta)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en la lata para medir el polvo.



✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	8 onzas líquidas	+	5 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas sin compactar + 1 cucharadita (cdta)

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas sin compactar. La fórmula en polvo Enfamil NeuroPro EnfaCare debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa sin compactar**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.



Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Enfamil NeuroPro™ EnfaCare®



Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna

con Fórmula para Bebés Enfamil NeuroPro EnfaCare

El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Enfamil NeuroPro EnfaCare a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso de la lata.



✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	1 cucharada (cda) + 1 cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	2 cucharadas (cdas) + 1 cucharadita (cdta)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en la lata para medir el polvo.



✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	5.5 onzas líquidas	+	4 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas sin compactar

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas sin compactar. La fórmula en polvo Enfamil NeuroPro EnfaCare debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa sin compactar**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.



Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Enfamil NeuroPro™ Infant



Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna

con Fórmula para Bebés Enfamil NeuroPro Infant

El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Enfamil NeuroPro Infant a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso del envase.

PREPARACIÓN
22 Calorías por onza líquida:

✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	¾ cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	1 cucharadita (cdta)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en el envase para medir el polvo.

PREPARACIÓN
22 Calorías por onza líquida:

✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	9 onzas líquidas	+	5 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas sin compactar

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas sin compactar. La fórmula en polvo Enfamil NeuroPro Infant debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa sin compactar**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.



Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Enfamil NeuroPro™ Infant



Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna

con Fórmula para Bebés Enfamil NeuroPro Infant

El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Enfamil NeuroPro Infant a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso del envase.

PREPARACIÓN
24 Calorías por onza líquida:

✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	1 cucharadita (cdta) + ½ cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	2 cucharaditas (cdtas)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en el envase para medir el polvo.

PREPARACIÓN
24 Calorías por onza líquida:

✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	6.5 onzas líquidas	+	4 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas sin compactar

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas sin compactar. La fórmula en polvo Enfamil NeuroPro Infant debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa sin compactar**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.



Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Enfamil NeuroPro™ Infant



Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna

con Fórmula para Bebés Enfamil NeuroPro Infant

El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Enfamil NeuroPro Infant a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso del envase.

PREPARACIÓN
27 Calorías por onza líquida:

✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	2 cucharaditas (cdtas) + ½ cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	1 cucharada (cda) + 1 cucharadita (cdta)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en el envase para medir el polvo.

PREPARACIÓN
27 Calorías por onza líquida:

✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	4 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas sin compactar + 1 cucharadita (cdta)

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas sin compactar. La fórmula en polvo Enfamil NeuroPro Infant debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa sin compactar**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.



Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Enfamil NeuroPro™ Infant



Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna

con Fórmula para Bebés Enfamil NeuroPro Infant

El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Enfamil NeuroPro Infant a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso del envase.



✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	2 onzas líquidas	+	2 cucharaditas (cdtas)
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	1 cucharada (cda) + 1 cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	2 cucharadas (cdas)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en el envase para medir el polvo.



✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	5 onzas líquidas	+	4 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas sin compactar

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas sin compactar. La fórmula en polvo Enfamil NeuroPro Infant debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa sin compactar**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.



Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Enfamil NeuroPro™ Gentlease®



Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna

con Fórmula para Bebés Enfamil NeuroPro Gentlease

El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Enfamil NeuroPro Gentlease a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso del envase.

PREPARACIÓN
22 Calorías por onza líquida:

✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	2 onzas líquidas	+	½ cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	1 cucharadita (cdta)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en el envase para medir el polvo.

PREPARACIÓN
22 Calorías por onza líquida:

✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	9 onzas líquidas	+	5 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas sin compactar

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas sin compactar. La fórmula en polvo Enfamil NeuroPro Gentlease debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa sin compactar**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.



Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Enfamil NeuroPro™ Gentlease®



Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna

con Fórmula para Bebés Enfamil NeuroPro Gentlease

El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Enfamil NeuroPro Gentlease a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso del envase.

PREPARACIÓN
24 Calorías por onza líquida:

✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	1 cucharadita (cdta) + ½ cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	2 cucharaditas (cdtas) + ½ cucharadita (cdta)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en el envase para medir el polvo.

PREPARACIÓN
24 Calorías por onza líquida:

✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	8 onzas líquidas	+	5 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas sin compactar

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas sin compactar. La fórmula en polvo Enfamil NeuroPro Gentlease debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa sin compactar**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.



Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Enfamil NeuroPro™ Gentlease®



Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna

con Fórmula para Bebés Enfamil NeuroPro Gentlease

El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Enfamil NeuroPro Gentlease a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso del envase.



✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	2 onzas líquidas	+	1 cucharadita (cdta) + ½ cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	1 cucharada (cda)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	1 cucharada (cda) + 1 cucharadita (cdta)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en el envase para medir el polvo.



✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	7 onzas líquidas	+	5 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas sin compactar

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas sin compactar. La fórmula en polvo Enfamil NeuroPro Gentlease debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa sin compactar**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.



Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Enfamil NeuroPro™ Gentlease®



Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna

con Fórmula para Bebés Enfamil NeuroPro Gentlease

El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Enfamil NeuroPro Gentlease a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso del envase.



✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	2 onzas líquidas	+	2 cucharaditas (cdtas)
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	1 cucharada (cda) + 1 cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	2 cucharadas (cdas)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en el envase para medir el polvo.



✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	5 onzas líquidas	+	4 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas sin compactar

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas sin compactar. La fórmula en polvo Enfamil NeuroPro Gentlease debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa sin compactar**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.



Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Nutramigen[®] con probiótico LGG[®]*



Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna con Fórmula Nutramigen con probiótico LGG

El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Nutramigen con probiótico LGG a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso de la lata.



✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	2 onzas líquidas	+	½ cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	1 cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	1 cucharadita (cdta) + ½ cucharadita (cdta)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en la lata para medir el polvo.



✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	9 onzas líquidas	+	5 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas y compactadas

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas compactadas. La fórmula en polvo Nutramigen con probiótico LGG debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa compactada**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.

* LGG[®] es una marca registrada de Chr. Hansen A/S.



Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Nutramigen[®] con probiótico LGG[®]*



Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna con Fórmula Nutramigen con probiótico LGG

El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Nutramigen con probiótico LGG a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso de la lata.

PREPARACIÓN
24 Calorías
por onza
líquida:

✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	2 cucharaditas (cdtas)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	2 cucharaditas (cdtas) + ½ cucharadita (cdta)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en la lata para medir el polvo.

PREPARACIÓN
24 Calorías
por onza
líquida:

✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	5 onzas líquidas	+	3 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas y compactadas

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas compactadas. La fórmula en polvo Nutramigen con probiótico LGG debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa compactada**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.

* LGG[®] es una marca registrada de Chr. Hansen A/S.



Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Nutramigen[®] con probiótico LGG[®]*



Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna con Fórmula Nutramigen con probiótico LGG

El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Nutramigen con probiótico LGG a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso de la lata.



✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	2 onzas líquidas	+	1 cucharadita (cdta) + ½ cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	1 cucharada (cda)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	1 cucharada (cda) + 2 cucharaditas (cdtas)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en la lata para medir el polvo.



✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	8 onzas líquidas	+	5 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas y compactadas + 2 cucharaditas (cdtas)

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas compactadas. La fórmula en polvo Nutramigen con probiótico LGG debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa compactada**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.

* LGG[®] es una marca registrada de Chr. Hansen A/S.



Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Nutramigen[®] con probiótico LGG[®]*



Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna con Fórmula Nutramigen con probiótico LGG

El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Nutramigen con probiótico LGG a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso de la lata.



✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	2 onzas líquidas	+	2 cucharaditas (cdtas) + ½ cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	1 cucharada (cda) + 1 cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	2 cucharadas (cdas) + 1 cucharadita (cdta)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en la lata para medir el polvo.



✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	7 onzas líquidas	+	5 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas y compactadas + 2 cucharaditas (cdtas)

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas compactadas. La fórmula en polvo Nutramigen con probiótico LGG debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa compactada**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.

* LGG[®] es una marca registrada de Chr. Hansen A/S.



Paciente: _____ Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Nutramigen[®] Toddler con probiótico LGG[®]*

Instrucciones de Mezcla para Aumentar Calorías

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en la lata para medir el polvo.



PREPARACIÓN 24 Calorías por onza líquida:	✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
	<input type="checkbox"/>	8 onzas líquidas	+	5 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas y compactadas
PREPARACIÓN 27 Calorías por onza líquida:	✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
	<input type="checkbox"/>	7 onzas líquidas	+	5 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas y compactadas
PREPARACIÓN 30 Calorías por onza líquida:	✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
	<input type="checkbox"/>	5 onzas líquidas	+	4 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas y compactadas

Nota: El polvo Nutramigen Toddler con probiótico LGG debe ser medido con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa compactada**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.

* LGG[®] es una marca registrada de Chr. Hansen A/S.



Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Enfamil A.R.™



Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna

con Fórmula para Bebés Enfamil A.R.

El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Enfamil A.R. a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso del envase.



✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	2 onzas líquidas	+	½ cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	1 cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	1 cucharadita (cdta) + ½ cucharadita (cdta)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en el envase para medir el polvo.



✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	9 onzas líquidas	+	5 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas sin compactar

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas sin compactar. La fórmula en polvo Enfamil A.R. debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa sin compactar**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.



Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Enfamil A.R.™



Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna

con Fórmula para Bebés Enfamil A.R.

El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Enfamil A.R. a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso del envase.



✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	2 onzas líquidas	+	1 cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	2 cucharaditas (cdtas)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	1 cucharada (cda)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en el envase para medir el polvo.



✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	6.5 onzas líquidas	+	4 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas sin compactar

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas sin compactar. La fórmula en polvo Enfamil A.R. debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa sin compactar**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.



Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Enfamil® Reguline®



Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna

con Fórmula para Bebés Enfamil Reguline

El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Enfamil Reguline a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso del envase.



✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	2 onzas líquidas	+	½ cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	1 cucharadita (cdta)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en el envase para medir el polvo.



✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	7 onzas líquidas	+	4 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas sin compactar

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas sin compactar. La fórmula en polvo Enfamil Reguline debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa sin compactar**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.



Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Enfamil® Reguline®



Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna

con Fórmula para Bebés Enfamil Reguline

El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Enfamil Reguline a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso del envase.

PREPARACIÓN 24 Calorías por onza líquida:	✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
	<input type="checkbox"/>		4 onzas líquidas	+
<input type="checkbox"/>		6 onzas líquidas	+	2 cucharaditas (cdtas) + ½ cucharadita (cdta)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en el envase para medir el polvo.

PREPARACIÓN 24 Calorías por onza líquida:	✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
	<input type="checkbox"/>		6.5 onzas líquidas	+

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas sin compactar. La fórmula en polvo Enfamil Reguline debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa sin compactar**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.



Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Enfamil® Reguline®



Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna

con Fórmula para Bebés Enfamil Reguline

El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Enfamil Reguline a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso del envase.



✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	2 onzas líquidas	+	1 cucharadita (cdta) + ½ cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	1 cucharada (cda)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	1 cucharada (cda) + 1 cucharadita (cdta)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en el envase para medir el polvo.



✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	7 onzas líquidas	+	5 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas sin compactar

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas sin compactar. La fórmula en polvo Enfamil Reguline debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa sin compactar**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.



Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Enfamil® Reguline®



Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna

con Fórmula para Bebés Enfamil Reguline

El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Enfamil Reguline a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso del envase.



✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	2 onzas líquidas	+	2 cucharaditas (cdtas)
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	1 cucharada (cda) + 1 cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	2 cucharadas (cdas)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en el envase para medir el polvo.



✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	2.5 onzas líquidas	+	2 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas sin compactar

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas sin compactar. La fórmula en polvo Enfamil Reguline debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa sin compactar**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.



Paciente: _____ Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Enfamil NeuroPro™ Sensitive



Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna

con Fórmula para Bebés Enfamil NeuroPro Sensitive

El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Enfamil NeuroPro Sensitive a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso del envase.



✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	2 onzas líquidas	+	½ cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	1 cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	1 cucharadita (cdta) + ½ cucharadita (cdta)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en el envase para medir el polvo.



✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	5.5 onzas líquidas	+	3 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas sin compactar

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas sin compactar. La fórmula en polvo Enfamil NeuroPro Sensitive debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa sin compactar**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.



Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Enfamil NeuroPro™ Sensitive



Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna

con Fórmula para Bebés Enfamil NeuroPro Sensitive

El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Enfamil NeuroPro Sensitive a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso del envase.



✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	1 cucharadita (cdta) + ½ cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	2 cucharaditas (cdtas) + ½ cucharadita (cdta)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en el envase para medir el polvo.



✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	6.5 onzas líquidas	+	4 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas sin compactar

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas sin compactar. La fórmula en polvo Enfamil NeuroPro Sensitive debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa sin compactar**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.



Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Enfamil NeuroPro™ Sensitive



Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna

con Fórmula para Bebés Enfamil NeuroPro Sensitive

El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Enfamil NeuroPro Sensitive a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso del envase.



✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	2 onzas líquidas	+	1 cucharadita (cdta) + ½ cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	1 cucharada (cda)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	1 cucharada (cda) + 1 cucharadita (cdta)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en el envase para medir el polvo.



✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	7 onzas líquidas	+	5 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas sin compactar

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas sin compactar. La fórmula en polvo Enfamil NeuroPro Sensitive debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa sin compactar**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.



Paciente: _____ Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Enfamil NeuroPro™ Sensitive



Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna

con Fórmula para Bebés Enfamil NeuroPro Sensitive

El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Enfamil NeuroPro Sensitive a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínicamente o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso del envase.



✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	2 onzas líquidas	+	2 cucharaditas (cdtas)
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	1 cucharada (cda) + 1 cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	2 cucharadas (cdas)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en el envase, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en el envase para medir el polvo.



✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	5 onzas líquidas	+	4 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas sin compactar

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas sin compactar. La fórmula en polvo Enfamil NeuroPro Sensitive debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa sin compactar**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.



Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Enfamil® ProSobee®

Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna

con Fórmula para Bebés Enfamil ProSobee



El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Enfamil ProSobee a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso de la lata.



✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	2 onzas líquidas	+	½ cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	1 cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	1 cucharadita (cdta) + ½ cucharadita (cdta)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en la lata para medir el polvo.



✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	5.5 onzas líquidas	+	3 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas sin compactar

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas sin compactar. La fórmula en polvo Enfamil ProSobee debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa sin compactar**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.



Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Enfamil® ProSobee®

Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna

con Fórmula para Bebés Enfamil ProSobee



El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Enfamil ProSobee a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso de la lata.



✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	1 cucharadita (cdta) + ½ cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	2 cucharaditas (cdtas) + ½ cucharadita (cdta)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en la lata para medir el polvo.



✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	5 onzas líquidas	+	3 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas sin compactar

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas sin compactar. La fórmula en polvo Enfamil ProSobee debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa sin compactar**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.



Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Enfamil® ProSobee®

Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna

con Fórmula para Bebés Enfamil ProSobee



El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Enfamil ProSobee a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso de la lata.



✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	2 onzas líquidas	+	1 cucharadita (cdta) + ½ cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	1 cucharada (cda)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	1 cucharada (cda) + 2 cucharaditas (cdtas)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en la lata para medir el polvo.



✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	7 onzas líquidas	+	5 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas sin compactar

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas sin compactar. La fórmula en polvo Enfamil ProSobee debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa sin compactar**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.



Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Enfamil[®] ProSobee[®]

Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna

con Fórmula para Bebés Enfamil ProSobee



El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Enfamil ProSobee a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso de la lata.



✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	2 onzas líquidas	+	2 cucharaditas (cdtas)
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	1 cucharada (cda) + 1 cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	2 cucharadas (cdas) + 1 cucharadita (cdta)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en la lata para medir el polvo.



✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	5 onzas líquidas	+	4 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas sin compactar

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas sin compactar. La fórmula en polvo Enfamil ProSobee debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa sin compactar**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.



Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

PurAmino™ Infant



Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna

con Fórmula para Bebés PurAmino

El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés PurAmino a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso de la lata.

PREPARACIÓN
22 Calorías por onza líquida:

✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	2 onzas líquidas	+	½ cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	1 cucharadita (cdta)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en la lata para medir el polvo.

PREPARACIÓN
22 Calorías por onza líquida:

✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	4.5 onzas líquidas	+	5 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas sin compactar

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas sin compactar. La fórmula en polvo para bebés PurAmino debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa sin compactar**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.

PURAMINO™

Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

PurAmino™ Infant



Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna

con Fórmula para Bebés PurAmino

El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés PurAmino a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso de la lata.

PREPARACIÓN
24 Calorías por onza líquida:

✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	1 cucharadita (cdta) + ½ cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	2 cucharaditas (cdtas)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en la lata para medir el polvo.

PREPARACIÓN
24 Calorías por onza líquida:

✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	2.5 onzas líquidas	+	3 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas sin compactar

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas sin compactar. La fórmula en polvo para bebés PurAmino debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa sin compactar**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.

PURAMINO™

Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

PurAmino™ Infant



Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna

con Fórmula para Bebés PurAmino

El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés PurAmino a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso de la lata.



✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	2 onzas líquidas	+	1 cucharadita (cdta) + ½ cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	1 cucharada (cda)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	1 cucharada (cda) + 1 cucharadita (cdta)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en la lata para medir el polvo.



✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	2.5 onzas líquidas	+	3 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas sin compactar + 1 cucharadita (cdta)

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas sin compactar. La fórmula en polvo para bebés PurAmino debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa sin compactar**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.

PURAMINO™

Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

PurAmino™ Infant



Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna

con Fórmula para Bebés PurAmino

El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés PurAmino a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso de la lata.



✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	2 onzas líquidas	+	2 cucharaditas (cdtas)
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	1 cucharada (cda) + 1 cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	2 cucharadas (cdas)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en la lata para medir el polvo.



✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	2.5 onzas líquidas	+	4 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas sin compactar

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas sin compactar. La fórmula en polvo para bebés PurAmino debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa sin compactar**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.

PURAMINO™

Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

PurAmino™ Jr.

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en la lata para medir el polvo.



PREPARACIÓN 40 Calorías por onza líquida:	✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)	Polvo para Agregar
	<input type="checkbox"/>	2 onzas líquidas	+
	✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)	Polvo para Agregar
PREPARACIÓN 45 Calorías por onza líquida:	<input type="checkbox"/>	3 onzas líquidas	+
	✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)	Polvo para Agregar
	<input type="checkbox"/>	3 onzas líquidas	+
	✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)	Polvo para Agregar
	<input type="checkbox"/>	3 onzas líquidas	+
	✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)	Polvo para Agregar
	<input type="checkbox"/>	3 onzas líquidas	+
	✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)	Polvo para Agregar
	<input type="checkbox"/>	3 onzas líquidas	+
	✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)	Polvo para Agregar
	<input type="checkbox"/>	3 onzas líquidas	+
	✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)	Polvo para Agregar
	<input type="checkbox"/>	3 onzas líquidas	+

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas sin compactar. El polvo PurAmino Jr debe ser medido con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa sin compactar**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.

PURAMINO™

Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Pregestimil®

Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna con Fórmula para Bebés Pregestimil



El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Pregestimil a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso de la lata.

PREPARACIÓN
22 Calorías por onza líquida:

✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	½ cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	1 cucharadita (cdta)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en la lata para medir el polvo.

PREPARACIÓN
22 Calorías por onza líquida:

✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	9 onzas líquidas	+	5 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas y compactadas

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas compactadas. La fórmula en polvo para bebés Pregestimil debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa compactada**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.



Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Pregestimil®

Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna

con Fórmula para Bebés Pregestimil



El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Pregestimil a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso de la lata.



✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	1 cucharadita (cdta) + ½ cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	2 cucharaditas (cdtas)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en la lata para medir el polvo.



✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	8 onzas líquidas	+	5 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas y compactadas

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas compactadas. La fórmula en polvo para bebés Pregestimil debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa compactada**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.



Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Pregestimil®

Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna con Fórmula para Bebés Pregestimil



El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Pregestimil a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso de la lata.



✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	2 cucharaditas (cdtas) + ½ cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	1 cucharada (cda) + 1 cucharadita (cdta)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en la lata para medir el polvo.



✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	7 onzas líquidas	+	5 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas y compactadas

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas compactadas. La fórmula en polvo para bebés Pregestimil debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa compactada**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.



Paciente: _____

Fecha: _____

Proveedor de Cuidado de Salud: _____

Pregestimil®

Instrucciones de Mezcla de Fortificación de Leche Materna

con Fórmula para Bebés Pregestimil



El fortificador de leche humana es el único producto diseñado para fortificar la leche materna, y las recetas de fortificación de la Fórmula para Bebés Pregestimil a continuación se ofrecen como una cortesía. Estas están basadas en resultados calculados de mezcla — no están probadas clínica o analíticamente.

En lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de leche materna y polvo para su receta específica. Sigue las instrucciones de **Almacenamiento del Polvo** en el reverso de la lata.



✓	Volumen Inicial de Leche Materna (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	4 onzas líquidas	+	1 cucharada (cda) + 1 cucharadita (cdta)
<input type="checkbox"/>	6 onzas líquidas	+	1 cucharada (cda) + 2 cucharaditas (cdtas)

Instrucciones Para Mezclar Fórmula con Agua

Sigue las instrucciones para la preparación y el uso en el reverso de la lata, **excepto**, en lugar de la tabla de preparación que aparece en la lata, usa las casillas marcadas de agua y polvo para su receta específica. Usa la cuchara dosificadora (el scoop) incluida en la lata para medir el polvo.



✓	Volumen Inicial de Agua (onzas líquidas)		Polvo para Agregar
<input type="checkbox"/>	5 onzas líquidas	+	4 cucharas dosificadoras (usando el scoop) rasas y compactadas

Nota: Todas las medidas de cucharadas son aproximadas y deben ser usadas rasas compactadas. La fórmula en polvo para bebés Pregestimil debe ser medida con la cuchara dosificadora (el scoop) **rasa compactada**. Los pesos en gramos son los más precisos para cumplir con el objetivo de la densidad calórica. Los volúmenes finales serán ligeramente más altos debido al desplazamiento del polvo.

