Materiał przeznaczony dla osób posiadających kwalifikacje w dziedzinie medycyny, farmacji i żywienia.

Nutramigen 3 LGG® Complete

Karta produktu

Właściwości, charakterystyka i przeznaczenie

Nutramigen 3 LGG® Complete jest hipoalergicznym preparatem zawierającym hydrolizat kazeiny o wysokim stopniu hydrolizy przeznaczonym dla dzieci powyżej 1. roku życia z alergią na białka mleka krowiego i białko soi.
Zawiera białko o znacznym stopniu hydrolizy, z unikalną kompozycją peptydów, które w połączeniu z *Lactobacillus* GG zwiększają efektywność postępowania dietetycznego w alergii na białka mleka krowiego i pomagają dziecku szybciej powrócić do normalnego żywienia.
Waniliowy smak może pomóc wprowadzić preparat u dziecka powyżej 1. roku życia. Nutramigen 3 LGG® Complete dostarcza wszystkich niezbędnych składników odżywczych jako część zróżnicowanej diety.
Nutramigen 3 LGG® Complete to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego i powinien być stosowany pod nadzorem lekarza.

Wskazania refundowane

- alergia na białka mleka krowiego (BMK),
- objawy alergii na BMK lub podejrzenie alergii na BMK ze względu na występujące objawy,
- nietolerancja laktozy,
- nietolerancja sacharozy,
- a także nadwrażliwość na inne białka (np. białka sojowe).

ODPŁATNOŚĆ 30%

Opakowanie i kod EAN

Nutramigen 3 LGG® Complete jest dostępny w puszkach o zawartości 400g proszku, pakowany w opakowania zbiorcze po 6 sztuk. EAN 8712045038833

Ważne informacje dotyczące karmienia:

Dla dobra dziecka zalecamy postępowanie zgodne z przedstawionymi wskazówkami. Właściwa higiena, przygotowanie, rozcieńczanie, użycie oraz przechowywanie są ważne podczas przygotowywania porcji do karmienia w butelce. Nie podgrzewać pokarmu w kuchence mikrofalowej, gdyż może to doprowadzić do poważnych poparzeń.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może wyrządzić ogromną szkodę dziecku. Podanie doustne. Nie podawać dożylnie.

więcej informacji na:
www.nutramigen.pl

lub pod numerem Infolinii:
801 40 50 60
(opłata za połączenie według taryfy lokalnej operatora)

Składniki

Syrop glukozowy, oleje roślinne (oleina palmowa, olej kokosowy, olej sojowy, olej słonecznikowy wysokooleinowy), hydrolizat kazeiny o wysokim stopniu hydrolizy (**z mleka**), fruktoza, modyfikowana skrobia kukurydziana, sole wapniowe kwasu cytrynowego,sole potasowe kwasu cytrynowego, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, sole magnezowe kwasu ortofosforowego, chlorek potasu, olej otrzymywany z mikroalg Schizochytrium sp., chlorek choliny, sole sodowe kwasu cytrynowego, kwas L-asorbinowy, aromat (wanilia), siarczan żelaza(II), żywe kultury *Lactobacillus rhamnosus* GG (0,02%), siarczan cynku, L-karnityna, octan DL-alfa-tokoferylu, nikotynamid, 6-palmitynian-L-askorbylu, D-pantotenian wapnia, palmitynian retinylu, siarczan miedzi(II), ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, siarczan manganu, kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), jodek sodu, chlorek chromu(III), molibdenian(VI) sodu, selenian(IV) sodu, filochinon (fitomenadion), D-biotyna, cholekalcyferol, cyjanokobalamina.

Informacje dietetyczne

U niemowląt karmionych preparatem Nutramigen 3 LGG® Complete stolce mogą być częstsze, luźniejsze i mieć ciemny i (lub) zielony kolor, co jest naturalną konsekwencją stosowania produktu.

Ważna informacja:

Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt. Nutramigen 1 LGG® Complete jest preparatem przeznaczonym do postępowania dietetycznego w alergii na białka mleka krowiego, białko soi lub z nietolerancją laktozy czy sacharozy i powinien być stosowany pod kontrolą lekarza.

Mead Johnson Nutrition (Poland) Sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, tel. 22 333 31 00, fax 22 333 31 01
Wszystkie prawa zastrzeżone. LGG® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Chr. Hansen A/S.

Nutramigen 3 LGG® Complete

Składnik odżywczy	Jednostka	na 100 g proszku	Na 100 ml gotowego produktu
Energia	kJ (kcal)	2090 (499)	283 (68)
Tłuszcz, w tym:	g	25	3,4
kwasy tłuszczowe nasycone	g	10,5	1,41
kwas linolowy	g	4	0,54
kwas α-linolenowy	mg	350	47
kwas dokozaheksaenowy	mg	115	15,5
Węglowodany, w tym:	g	57	7,7
Cukry	g	26	3,5
Białko	g	11,5	1,55
Sól	g	0,44	0,06
Witaminy			
Witamina A	µg	480	65
Witamina D	µg	12,5	1,68
Witamina E, α-tokoferol	mg	7,7	1,04
Witamina K	µg	40	5,4
Witamina C	mg	55	7,4
Tiamina	mg	0,5	0,067
Ryboflawina	mg	0,9	0,121
Niacyna	mg	7,9	1,06
Witamina B6	mg	0,75	0,101
Kwas foliowy	µg	110	14,8
Witamina B12	µg	1,05	0.141
Biotyna	µg	17,5	2,4
Kwas pantotenowy	mg	3,9	0.52
Składniki mineralne			
Sód	mg	175	24
Potas	mg	700	94
Chlorki	mg	350	47
Wapń	mg	750	101
Fosfor	mg	350	47
Magnez	mg	60	8,1
Żelazo	mg	8	1,08
Cynk	mg	5,5	0,74
Miedź	mg	0,38	0,05
Mangan	mg	0,03	0,04
Selen	µg	20	2,7
Chrom	µg	15	2
Molibden	µg	21	2,8
Pozostałe			
Jod	µg	115	15,5
Cholina	mg	120	16,1
Osmolarność	mOsm/L		351

Warunki przechowywania

Puszkę przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od 15°C do 25°C. Po otwarciu puszkę należy przechowywać szczelnie zamkniętą, w suchym miejscu w temperaturze od 15°C do 25°C, a zawartość należy zużyć w ciągu jednego miesiąca od pierwszego otwarcia. Nie zamrażać i chronić przed światłem oraz nadmiernym nagrzaniem.

Wskazówki dotyczące karmienia

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy kierować się poniższymi wskazówkami dotyczącymi karmienia.

Wiek	Liczba karmień butelką na dobę (24h)	woda ml	Ilość miarek*
powyżej 1. roku życia	2	210	7

*Proszek należy odmierzać wyłącznie za pomocą miarki dołączonej do opakowania. 1 płaska miarka (4,5 g proszku) na każde 30 ml wody. Nie ugniatać proszku w miarce. Nadmiar proszku należy usunąć tępą stroną czystego i suchego noża.

Sposób przygotowania i użytkowania:

W celu prawidłowego przygotowania mieszanki zalecamy postępować zgodnie z instrukcją.

1. Przed przygotowaniem pokarmu należy dokładnie umyć ręce. Umyj i wygotować w wodzie butelki, smoczki, nakrętki i naczynia (przez 1 minutę we wrzącej wodzie).

2. Gotować świeżą wodę przez 1 minutę, a następnie pozostawić aż ostygnie do temperatury pokojowej. Wlać potrzebną ilość wody do czystej butelki.

3. Dodać potrzebną ilość miarek proszku do wody (ilość odczytać z tabeli). **Suchą miarkę** przechowywać w .puszce

4. Zakręcić butelkę, **dokładnie wymieszać** zawartość ruchem obrotowym między dłońmi, a następnie wstrząsając do całkowitego rozpuszczenia (**około 1 minuty**). Przed podaniem dziecku sprawdzić temperaturę mieszanki poprzez wylanie kilku kropli mleka z butelki na wewnętrzną stronę nadgarstka.

5. **Po rozpuszczeniu w wodzie produkt szybko sie psuje. Mieszankę należy podać zaraz po przygotowaniu.** Po rozpoczęciu karmienia mieszanka powinna być wykorzystana w ciągu 1 godziny i nie powinna być przechowywana w lodówce. **Przygotowanej mieszanki nie wolno zamrażać.** Pozostałą po karmieniu mieszankę należy wylać, a przybory i naczynia wymyć.

dla dzieci powyżej 1. roku życia