Materiał przeznaczony dla osób posiadających kwalifikacje w dziedzinie medycyny, farmacji i żywienia.

Nutramigen Puramino
Karta produktu

Właściwości, charakterystyka i przeznaczenie

Nutramigen PURAMINO jest hipoalergicznym preparatem zawierającym wolne aminokwasy, przeznaczonym dla dzieci z alergią na białka mleka krowiego, alergią na wiele pokarmów, także dla tych, które nie tolerują lub nadal reagują alergią na hydrolizat o wysokim stopniu hydrolizy białka. Jest przeznaczony także dla niemowląt i dzieci z innymi schorzeniami, w przebiegu których zalecane jest wprowadzenie diety elementarnej, w tym: eozynofilowe zapalenie przełyku (EoE) i opóźniony rozwój, będący następstwem zaburzeń trawienia/wchłaniania i niedożywienia białkowo-energetycznego.
Nutramigen PURAMINO zawiera średniołancuchowe trójglicerydy (MCT), aby dostarczyć łatwo dostępne źródło tłuszczów i energii w przypadku zaburzeń wchłaniania.
Nutramigen PURAMINO przeznaczony jest dla niekarmionych piersią niemowląt od urodzenia oraz dzieci. Nutramigen PURAMINO może stanowić jedyne źródło pożywienia. Po ukończeniu 6. miesiąca życia Nutramigen PURAMINO dostarcza wszystkich składników odżywczych, jako część różnicującej się diety niemowlęcia i dziecka.
Nutramigen PURAMINO to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego i powinien być stosowany pod nadzorem lekarza.

Wskazania refundowane

- zastosowanie dietetyczne u niemowląt od urodzenia i dzieci z ciężką postacią alergii na białka mleka krowiego
- z nietolerancją różnego rodzaju żywności
- u których zastosowanie w postępowaniu dietetycznym hydrolizatów o znacznym stopniu hydrolizy nie przyniosło efektu
- w alergii na białko sojowe
- gdy wskazane jest zastosowanie mieszanki elementarnej zwyczajnej

ODPŁATNOŚĆ RYCZAŁTOWA

Opakowanie i kod EAN

Nutramigen PURAMINO jest dostępny w puszkach o zawartości 400g proszku, pakowany w opakowania zbiorcze po 6 sztuk. EAN 8712045027554

więcej informacji na:
www.nutramigen.pl

lub pod numerem Infolinii:
801 40 50 60
(opłata za połączenie według taryfy lokalnej operatora)

Składniki

Syrop glukozowy, oleje roślinne (wysokooleinowy olej słonecznikowy, trójglicerydy kwasów tłuszczowych średniołańcuchowych z oleju kokosowego/palmowego, olej sojowy), skrobia tapiokowa, asparaginian potasu, L-leucyna, chlorowodorek L-lizyny, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, L-prolina, L-alanina, L-walina, L-izoleucyna, glutaminian monosodowy, L-treonina, L-seryna, L-tyrozyna, kwas L-asparaginowy, L-arginina, L-fenyloalanina, sole magnezowe kwasu ortofosforowego, L-histydyna, cystyna, glicyna, L-tryptofan,olej otrzymywany z Mortierella alpina, L-metionina, chlorek potasu, olej otrzymywany z mikroalg Schizochytrium sp., sole wapniowe kwasu cytrynowego, chlorek choliny, cytrynian sodu, inozytol, kwas L-askorbinowy, siarczan żelaza(II), tauryna, siarczan cynku, L-karnityna, octan DL-alfa-tokoferylu, nikotynamid, D-pantotenian wapnia, palmitynian retinylu, siarczan miedzi(II), chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, siarczan manganu, jodek sodu, chlorek chromu(III), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), filochinon (fitomenadion), selenian(IV) sodu, molibdenian(VI) sodu, D-biotyna, cholekalcyferol, cyjanokobalamina.

Informacje dietetyczne

U niemowląt i dzieci żywionych Nutramigen PURAMINO stolce mogą być częstsze, luźniejsze i mieć ciemny i (lub) zielony kolor.

Przeciwwskazania:

Preparaty w proszku przeznaczone do żywienia niemowląt nie są sterylne i nie powinny bez nadzoru lekarza być stosowane do karmienia niemowląt z zaburzeniami odporności.

Ważna informacja:

Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt. Nutramigen PURAMINO jest zalecany w postępowaniu żywieniowym w alergii na białka pokarmowe, w tym alergii wielopokarmowej, a także wtedy, gdy wymagana jest dieta elementarna i powinien być stosowany pod kontrolą lekarza.

Mead Johnson Nutrition (Poland) Sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, tel. 22 333 31 00, fax 22 333 31 01

Nutramigen PURAMINO

Składnik odżywczy	Jednostka	na 100 g proszku	Na 100 ml gotowego produktu
Energia	kJ (kcal)	2140 (503)	285 (68)
Tłuszcz, w tym:	g	28	3,7
kwasy tłuszczowe nasycone	g	10,7	1,41
kwas linolowy	g	3,5	0,46
kwas α-linolenowy	mg	370	49
kwas arachidonowy	mg	148	19,5
kwas dokozaheksaenowy	mg	117	15,5
Węglowodany, w tym:	g	52	6,9
Cukry	g	4,2	0,55
Białko	g	14,3	1,88
Sól	g	0,42	0,06
Witaminy			
Witamina A	µg	430	57
Witamina D	µg	12,25	1,63
Witamina E, α-tokoferol	mg	4,6	0,61
Witamina K	µg	46	6,1
Witamina C	mg	48	6,4
Tiamina	mg	0,31	0,04
Ryboflawina	mg	0,41	0,054
Niacyna	mg	4,7	0,63
Witamina B6	mg	0,38	0,05
Foliany, DFE	µg	87	11,4
Kwas foliowy	µg	52	6,9
Witamina B12	µg	0,92	0.121
Biotyna	µg	12,2	1,62
Kwas pantotenowy	mg	2,9	0.38
Składniki mineralne			
Sód	mg	168	22
Potas	mg	730	96
Chlorki	mg	450	60
Wapń	mg	580	76
Fosfor	mg	330	44
Magnez	mg	61	8,1
Żelazo	mg	7,7	1,01
Cynk	mg	4,6	0,61
Miedź	mg	0,38	0,05
Mangan	mg	0,087	0,011
Selen	µg	18,4	2,4
Chrom	µg	26	3,4
Molibden	µg	15,8	2,1
Pozostałe			
Jod	µg	102	13,5
Cholina	mg	163	22
Inozytol	mg	87	11,4
L-karnityna	mg	10,2	1,35
Tauryna	mg	31	4
Osmolarność	mOsm/L		314

Warunki przechowywania

Puszkę przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od 15°C do 25°C. Po otwarciu puszkę należy przechowywać szczelnie zamkniętą, w suchym miejscu w temperaturze od 15°C do 25°C, a zawartość należy zużyć w ciągu jednego miesiąca od pierwszego otwarcia. Nie zamrażać i chronić przed światłem oraz nadmiernym nagrzaniem.

Wskazówki dotyczące karmienia

Rekomendowane dawkowanie, a także rozcieńczenia Nutramigen PURAMINO muszą być określone wyłącznie przez lekarza i zależą od wieku, masy ciała i stanu klinicznego pacjenta, a także od udziału innych produktów w diecie dziecka. Należy kierować się poniższymi wskazówkami dotyczącymi karmienia:

Wiek	Przykładowa masa ciała	Liczba karmień butelką na dobę (24h)	woda ml	Ilość miarek*
0-2 tygodnie	<3-3,5	6	90	3
2-4 tygodnie	3,5-4	5-6	120	4
1-2 miesiące	4-5	5	150	5
2-4 miesiące	5-6,5	4	180	6
4-6 miesiące	>6,5	4	210	7
6-12 miesięcy	7,5-9,5	2-3	240	8
>1 roku	>9,5	2-3	240	8

*Proszek należy odmierzać **wyłącznie** za pomocą miarki dołączonej do opakowania. Jedna płaska miarka (4,4 g) na każde 30 ml wody. Nie ugniatać proszku w miarce. Nadmiar proszku można usunąć z miarki tępą stroną czystego i suchego noża.

Sposób przygotowania i użytkowania:

W celu prawidłowego przygotowania mieszanki zalecamy postępować zgodnie z instrukcją.

1. Przed przygotowaniem pokarmu należy dokładnie umyć ręce. Umyć i wygotować w wodzie butelki, smoczki, nakrętki i naczynia (przez co najmniej 1 minutę we wrzącej wodzie).

2. Przed dodaniem proszku gotować świeżą wodę przez co najmniej 1 minutę, a następnie pozostawić aż ostygnie do temperatury pokojowej. Wlać potrzebną ilość ostudzonej wody do czystej butelki/kubka.
.

3. Dodać odpowiednią **ilość miarek** proszku do wody (ilość odczytać z tabeli). **Suchą** miarkę przechowywać w puszce.

4. Zakręcić butelkę/kubek, **dokładnie wymieszać** zawartość ruchem obrotowym między dłońmi. Przed podaniem dziecku sprawdzić temperaturę mieszanki poprzez wylanie kilku kropli mleka z butelki na wewnętrzną stronę nadgarstka.

5. Przygotowany roztwór szybko się psuje. **Należy podać do karmienia natychmiast po przygotowaniu** lub przykryć i przechowywać w lodówce w temperaturze 2-4°C nie dłużej niż 24 godziny. **Nie zamrażać rozpuszczonego roztworu** i nie używać jeśli pozostawał poza lodówka przez ponad 2 godziny. Mieszankę podaną dziecku należy zużyć do karmienia w ciągu 1 godziny i nie należy dalej przechowywać w lodówce. Pozostałą po karmieniu mieszankę wylać, a naczynia i przybory wymyć.

dla niemowląt od urodzenia i dzieci