

DIAGNÓZIS


„Minél korábban fordul orvoshoz tüneteivel,
annál nagyobb eséllyel nyerhető vissza a
funkcionalitás korábbi szintje.

Fontos tehát a korai stádiumban felállított diagnózis.^{10,14,15} Amennyiben a betegséget nem kezelik időben és hatékonyan, ez állapotának romlásához illetve kórházi bentfekvéshez vezethet.¹⁶

Kezelés nélkül a tüneteknek is negatív hatásuk lehet Önre és környezetére egyaránt.^{3,17}”

Ha a szkizofrénia bármely tünetét érzékeli, vagy úgy érzi, már nem hat a gyógyszere, forduljon orvosához!

Hogy állapítja meg az orvos, hogy mi a probléma?



Az orvos elbeszélget Önnel, hogy a lehető legtöbbet megtudjon a tüneteiről és mindarról, amin Ön keresztülment. Feltesz majd néhány kérdést:

- a személyes és betegség-történetéről;
- milyen tüneteket észlel;
- mióta észleli ezeket;
- a tünete változtak-e az idő múlásával és hogyan;
- vannak-e kiváltó tényezők.

Az orvos elbeszélget az Ön családjával vagy akik közel állnak Önhöz, hogy megismerje az állapotának hátterét és történetét. Egyéb orvosi vizsgálatokra is szükség lehet, mint vérvizsgálat, röntgen vagy agyszkenelés. Ezeket azért végzik, hogy az általános egészségi állapotáról képet kapjanak és megállapítsák, a tüneteinek van-e fizikai oka. Lehetséges, hogy pszichológiai tesztet is kitöltenek Önnel, hogy többet tudjanak a személyiségéről és az agya funkcionális állapotáról.

Fontos, hogy a tünetek hogyan befolyásolják a mindennapi életét, ezért az orvos vagy asszisztens kérdezni fog majd a szociális helyzetéről, a munkájáról, tevékenységeiről és a családjához, barátaihoz fűződő viszonyáról.

Hivatkozások

3. Kendler KS et al. Arch Gen Psychiatry 1996; 53: 1022-1031.
10. Howard R et al. Am J Psychiatry 2000; 157: 172-178.
14. Harrigan SM et al. Psychol Med 2003; 33: 97-110.
15. Bottlender R et al. Schizophr Res 2003; 62: 37-44.
16. Emsley R et al. Curr Opin Psychiatry 2008; 21: 173-177.
17. Awad AG et al. Pharmacoeconomics 2008; 26: 149-162.

PHHU/PSY/1115/0003a