

**ENFAMIL® ENFALYTE® ORAL ELECTROLYTE SOLUTION
(177 ML) (4x6 BOTTLES)
SKU Number: 2045169**

US Healthcare Professional Website Link:
<https://hcp.meadjohnson.com/s/product/a4R4J000000PpQCUA0/enfamil-enfalyte>

PRODUCT BOTTLE LABEL

English	French
<p>READY TO USE</p> <p>Enfamil™</p> <p>ENFALYTE® helps promote fluid absorption</p> <p>Oral electrolyte Solution</p> <p>Natural cherry flavor with other natural flavor</p> <p>6 FL OZ (177 mL) Pareve Ingredients; Manufactured on Dairy Equipment</p>	<p>PRÊTE À SERVIR</p> <p>Enfamil^{MC}</p> <p>ENFALYTE® favorise l'absorption des liquides</p> <p>Solution électrolytique Orale</p> <p>Saveur naturelle de cerise combinée à d'autres saveurs naturelles</p> <p>177 ML (6 oz liq.) Ingrédients parève; préparé avec de l'équipement servant aux produits laitiers</p>
<p>Instructions for use</p> <p>USE UNDER MEDICAL SUPERVISION. READY TO USE. DO NOT ADD WATER OR DILUTE. For infants and toddlers under 2 years of age: Consult your doctor. For children 2 years of age and older: Offer small, frequent sips every 15-30 minutes. Increase serving as tolerated. Contact your healthcare provider if you continue to see/experience signs of dehydration. Upon opening, either feed immediately or replace cap and store in refrigerator at 35-40°F (2-4°C) for no longer than 24 hours. Do not freeze. After feeding begins, use within one hour or discard.</p> <p>Wash hands thoroughly with soap and water before preparing bottle for feeding. Remove cap. Attach nipple unit (not included).</p> <p>WARNING: Do not use a microwave oven to warm solution. Serious burns may result. Storage: Store unopened bottles at room temperature or refrigerate. Avoid excessive heat and prolonged exposure to light. Do not freeze. WARNING: Do not mix with infant formula, milk, fruit juices or other electrolyte-containing liquids. Not for parenteral (I.V.) use. THIS PRODUCT SHOULD BE USED ONLY AS DIRECTED BY YOUR CHILD'S DOCTOR. IF</p>	<p>Mode d'emploi</p> <p>UTILISER SOUS SUPERVISION MÉDICALE. PRÊT À SERVIR. NE PAS AJOUTER D'EAU NI DILUER. Pour les nourrissons et les enfants de moins de 2 ans : consulter votre médecin. Pour les enfants de 2 ans et plus : offrir fréquemment de petites gorgées, toutes les 15 à 30 minutes. Augmenter la quantité selon la tolérance. Communiquer avec votre fournisseur de soins de santé si les signes de déshydratation sont toujours présents. Après l'ouverture, servir immédiatement ou remettre le bouchon en place et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (entre 35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas congeler. Après le début de la consommation, jeter tout contenu inutilisé après une heure. Se laver soigneusement les mains avec du savon et de l'eau avant de préparer la bouteille à servir. Retirer le bouchon. Mettre la tétine en place (non incluse).</p> <p>MISE EN GARDE : Ne pas réchauffer la solution au micro-ondes. Cela pourrait entraîner de graves brûlures. Conservation : Conserver les bouteilles non ouvertes à la température ambiante ou au réfrigérateur. Éviter la chaleur excessive et l'exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler. MISE EN GARDE : Ne pas mélanger avec de la</p>



VOMITING OR FEVER IS PRESENT, OR
DIARRHEA CONTINUES BEYOND 24 HOURS,
CONSULT YOUR CHILD'S DOCTOR.

THIS UNIT NOT INTENDED FOR INDIVIDUAL
SALE. DO NOT USE IF CAP RING IS BROKEN
OR MISSING. USE BY DATE ON BOTTLE
LABEL.

If you have a question, we are here for you. Call
us toll free: 1-800-361-6323, 9 am to 5 pm
Monday-Friday, Eastern Time. Or visit
hcp.meadjohnson.com

MEAD JOHNSON & COMPANY, LLC,
EVANSVILLE, IN 47721 U.S.A. ©2022 Mead
Johnson & Company, LLC

For Canada: 1 800 361-6323
Enfamil.ca

préparation pour nourrissons, du lait, du jus de
fruits ou d'autres liquides contenant des
électrolytes. Ne pas utiliser par voie parentérale
(intraveineuse).

CE PRODUIT NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE SUR
LES CONSEILS DU MÉDECIN DE VOTRE
ENFANT. SI L'ENFANT VOMIT OU FAIT DE LA
FIÈVRE, OU SI LA DIARRHÉE SE POURSUIT
DURANT PLUS DE 24 HEURES, CONSULTER
SON MÉDECIN.

CET ARTICLE N'EST PAS DESTINÉ À LA
VENTE INDIVIDUELLE. NE PAS UTILISER SI LE
SCEAU ENTOURANT LE BOUCHON EST BRISÉ
OU MANQUANT. UTILISER AVANT LA DATE
FIGURANT SUR L'ÉTIQUETTE DE LA
BOUTEILLE.

Si vous avez des questions, nous sommes là pour
y
répondre. Appelez-nous sans frais : 1-800-361-
6323, de
9 h à 17 h, du lundi au vendredi, heure de l'Est ou
visitez hcp.meadjohnson.com

MEAD JOHNSON & COMPANY, LLC
EVANSVILLE, IN 47721 États-Unis ©2022 Mead
Johnson & Company, LLC

Pour le Canada : 1 800 361-6323
Enfamil.ca

ENFAMIL® ENFALYTE® ORAL ELECTROLYTE SOLUTION
(177 ML) (4x6 BOTTLES)
SKU Number: 2045169

PRODUCT CARTON

English	French																																										
<p>Enfamil™</p> <p>READY TO USE • NIPPLE READY •</p> <p>ENFALYTE® helps promote fluid absorption Oral electrolyte solution Natural cherry flavor with other natural flavor</p> <p>nipple not included</p> <p>ENHANCED FLAVOR Rapidly replaces fluids & electrolytes lost in diarrhea & vomiting</p> <p>1675-03</p> <p>6 - 6 FL OZ (177 mL) BOTTLES (NET 36 FL OZ • 1.13 QT • 1.06 L)</p> <p>Pareve Ingredients; Manufactured on Dairy Equipment</p> <p>Oral electrolyte solution Natural cherry flavor with other natural flavor</p> <p>nipple not included</p> <p>ENHANCED FLAVOR Rapidly replaces fluids & electrolytes lost in diarrhea & vomiting</p> <p>6 - 6 FL OZ (177 mL) BOTTLES (NET 36 FL OZ • 1.13 QT • 1.06 L)</p>	<p>Enfamil^{MC}</p> <p>PRÊTE À SERVIR • PRÊTE À RECEVOIR UNE TÉTINE •</p> <p>ENFALYTE® favorise l'absorption des liquides Solution électrolytique orale Arôme naturel de cerise combiné à d'autres arômes naturels</p> <p>tétine non incluse</p> <p>SAVEUR AMÉLIORÉE Comble rapidement les pertes de liquides et d'électrolytes causées par la diarrhée et les vomissements</p> <p>1675-03</p> <p>6 — BIBERONS DE 177 mL (6 oz liq.) (36 oz liq. net • 1,13 pte • 1,06 L)</p> <p>Ingrédients parèves; installations laitières utilisées</p> <p>Solution électrolytique orale Arôme naturel de cerise combiné à d'autres arômes naturels</p> <p>tétine non incluse</p> <p>SAVEUR AMÉLIORÉE Comble rapidement les pertes de liquides et d'électrolytes causées par la diarrhée et les vomissements</p> <p>6 — BIBERONS DE 177 mL (6 oz liq.) (36 oz liq. net • 1,13 pte • 1,06 L)</p>																																										
<p>INSTL 167503 LIST 1675-03 SAP 2067988</p>	<p>INSTL 167503 LIST 1675-03 SAP 2067988</p>																																										
<table border="0"> <tr> <td>Electrolytes</td> <td>mEq per 32 fl oz</td> <td>mmole per 100</td> </tr> <tr> <td>mL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SODIUM.....</td> <td>47.....</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>..5 CHLORIDE.....</td> <td></td> <td>4,5</td> </tr> <tr> <td>43.....</td> <td>4.5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>POTASSIUM</td> <td>24.....</td> <td>3,3</td> </tr> <tr> <td>2.5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CITRATE.....</td> <td>31.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>NOTE: Enfalyte® Oral Electrolyte Solution contains 30 g of corn syrup solids per liter. Each 100 mL of Enfalyte supplies about 12.6 Calories; each fl oz, 3.7 Calories.</p>	Electrolytes	mEq per 32 fl oz	mmole per 100	mL			SODIUM.....	47.....	5	..5 CHLORIDE.....		4,5	43.....	4.5	2,5	POTASSIUM	24.....	3,3	2.5			CITRATE.....	31.....		3.3			<table border="0"> <tr> <td>Électrolytes</td> <td>mEq par 32 oz liq.</td> <td>mmole par 100 mL</td> </tr> <tr> <td>SODIUM.....</td> <td>47.....</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>CHLORURE.....</td> <td>43.....</td> <td>4,5</td> </tr> <tr> <td>POTASSIUM.....</td> <td>24.....</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>CITRATE.....</td> <td>31.....</td> <td>3,3</td> </tr> </table> <p>REMARQUE : La solution électrolytique orale Enfalyte® contient 30 g de sirop de glucose de maïs déshydraté par litre. Chaque 100 mL de solution Enfalyte fournit environ 12,6 calories; chaque oz liq., 3,7 calories.</p> <p>INGRÉDIENTS : EAU, SIROP DE GLUCOSE DE MAÏS DÉSHYDRATÉ, ARÔME NATUREL, CITRATE DE</p>	Électrolytes	mEq par 32 oz liq.	mmole par 100 mL	SODIUM.....	47.....	5	CHLORURE.....	43.....	4,5	POTASSIUM.....	24.....	2,5	CITRATE.....	31.....	3,3
Electrolytes	mEq per 32 fl oz	mmole per 100																																									
mL																																											
SODIUM.....	47.....	5																																									
..5 CHLORIDE.....		4,5																																									
43.....	4.5	2,5																																									
POTASSIUM	24.....	3,3																																									
2.5																																											
CITRATE.....	31.....																																										
3.3																																											
Électrolytes	mEq par 32 oz liq.	mmole par 100 mL																																									
SODIUM.....	47.....	5																																									
CHLORURE.....	43.....	4,5																																									
POTASSIUM.....	24.....	2,5																																									
CITRATE.....	31.....	3,3																																									

<p>INGREDIENTS: WATER, CORN SYRUP SOLIDS, NATURAL FLAVOR, POTASSIUM CITRATE, SALT (SODIUM CHLORIDE), CITRIC ACID, SODIUM CITRATE.</p> <p>©2022 Mead Johnson & Company, LLC MEAD JOHNSON & COMPANY, LLC, EVANSVILLE, IN 47721 U.S.A.</p> <p>Mead Johnson Nutrition™</p>	<p>POTASSIUM, SEL (CHLORURE DE SODIUM), ACIDE CITRIQUE, CITRATE DE SODIUM.</p> <p>©2022 Mead Johnson & Company, LLC MEAD JOHNSON & COMPANY, LLC EVANSVILLE, IN 47721 États-Unis</p> <p>Mead Johnson Nutrition^{MC}</p>
<p>Enfamil™</p> <p>READY TO USE • NIPPLE READY • ENFALYTE® helps promote fluid absorption Oral electrolyte solution Natural cherry flavor with other natural flavor</p> <p>nipple not included</p> <p>ENHANCED FLAVOR Rapidly replaces fluids & electrolytes lost in diarrhea & vomiting</p> <p>1675-03 6 – 6 FL OZ (177 mL) BOTTLES (NET 36 FL OZ • 1.13 QT • 1.06 L)</p> <p>Pareve Ingredients; Manufactured on Dairy Equipment</p>	<p>Enfamil^{MC}</p> <p>PRÊTE À SERVIR • PRÊTE À RECEVOIR UNE TÉTINE • ENFALYTE® favorise l'absorption des liquides Solution électrolytique orale Arôme naturel de cerise combiné à d'autres arômes naturels</p> <p>tétine non incluse</p> <p>SAVEUR AMÉLIORÉE Comble rapidement les pertes de liquides et d'électrolytes causées par la diarrhée et les vomissements</p> <p>1675-03 6 — BIBERONS DE 177 mL (6 oz liq.) (36 oz liq. Net • 1,13 pte • 1,06 L)</p> <p>Ingrédients parèves; installations laitières utilisées</p>
<p>Enfamil™</p> <p>READY TO USE • NIPPLE READY • ENFALYTE® helps promote fluid absorption</p>	<p>Enfamil^{MC}</p> <p>PRÊTE À SERVIR • PRÊTE À RECEVOIR UNE TÉTINE • ENFALYTE® favorise l'absorption des liquides</p>
<p>Enfamil™</p> <p>READY TO USE • NIPPLE READY • ENFALYTE® helps promote fluid absorption Oral electrolyte solution Natural cherry flavor with other natural flavor</p>	<p>Enfamil^{MC}</p> <p>PRÊTE À SERVIR • PRÊTE À RECEVOIR UNE TÉTINE • ENFALYTE® favorise l'absorption des liquides Solution électrolytique orale Arôme naturel de cerise combiné à d'autres arômes naturels</p>
<p>Instructions for use</p> <p>USE UNDER MEDICAL SUPERVISION. READY TO USE. DO NOT ADD WATER OR DILUTE.</p> <p>For infants and toddlers under 2 years of age: Consult your doctor.</p> <p>For children 2 years of age and older: Offer small, frequent sips every 15-30 minutes. Increase serving as tolerated. Contact your healthcare</p>	<p>Mode d'emploi</p> <p>UTILISER SOUS SUPERVISION MÉDICALE. PRÊTE À SERVIR. NE PAS AJOUTER D'EAU NI DILUER.</p> <p>Pour les nourrissons et les enfants de moins de 2 ans : consulter votre médecin.</p> <p>Pour les enfants de 2 ans et plus : offrir fréquemment de petites gorgées, toutes les 15 à 30 minutes. Augmenter la quantité selon la tolérance. Communiquer avec</p>

provider if you continue to see/experience signs of dehydration.

Upon opening, either feed immediately or replace cap and store in refrigerator at 35-40°F (2-4°C) for no longer than 24 hours. Do not freeze. After feeding begins, use within one hour or discard.

Wash hands thoroughly with soap and water before preparing bottle for feeding.

Remove cap.

Attach nipple unit (not included).

WARNING: Do not use a microwave oven to warm solution. Serious burns may result.

Storage: Store unopened bottles at room temperature or refrigerate. Avoid excessive heat and prolonged exposure to light. Do not freeze.

WARNING: Do not mix with infant formula, milk, fruit juices or other electrolyte-containing liquids. Not for parenteral (I.V.) use.

THIS PRODUCT SHOULD BE USED ONLY AS DIRECTED BY YOUR CHILD'S DOCTOR. IF VOMITING OR FEVER IS PRESENT, OR DIARRHEA CONTINUES BEYOND 24 HOURS, CONSULT YOUR CHILD'S DOCTOR. DO NOT USE IF CAP RING IS BROKEN OR MISSING. USE BY DATE ON CARTON AND BOTTLE LABEL. DO NOT ACCEPT IF PACKAGE HAS BEEN OPENED.

Enfamil reduces its environmental impact by using 100% recycled paperboard.

If you have a question, we are here for you. Call us toll free: 1-800-361-6323, 9 am to 5 pm Monday-Friday, Eastern Time. Or visit hcp.meadjohnson.com (U.S. product website)

For Canada : 1 800 361-6323
Enfamil.ca

votre fournisseur de soins de santé si les signes de déshydratation sont toujours présents.

Après l'ouverture, servir immédiatement ou remettre le bouchon en place et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (entre 35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas congeler. Jeter toute quantité inutilisée une heure après le début de la consommation.

Se laver soigneusement les mains avec du savon et de l'eau avant de préparer la bouteille.

Retirer le bouchon.

Mettre la tétine en place (non incluse).

MISE EN GARDE : Ne pas réchauffer la solution au micro-ondes. Cela pourrait entraîner de graves brûlures.

Entreposage : Conserver les bouteilles non ouvertes à la température ambiante ou au réfrigérateur. Éviter la chaleur excessive et l'exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.

MISE EN GARDE : Ne pas mélanger avec de la préparation pour nourrissons, du lait, du jus de fruits ou d'autres liquides contenant des électrolytes. Ne pas utiliser par voie parentérale (intraveineuse).

CE PRODUIT NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE SUR LES CONSEILS DU MÉDECIN DE VOTRE ENFANT. SI L'ENFANT VOMIT OU FAIT DE LA FIÈVRE, OU SI LA DIARRHÉE SE POURSUIT DURANT PLUS DE 24 HEURES, CONSULTER SON MÉDECIN. NE PAS UTILISER SI LE SCEAU ENTOURANT LE BOUCHON EST BRISÉ OU MANQUANT. UTILISER AVANT LA DATE FIGURANT SUR LA BOÎTE OU SUR L'ÉTIQUETTE DE LA BOUTEILLE. NE PAS ACCEPTER SI L'EMBALLAGE A ÉTÉ OUVERT.

Enfamil réduit son empreinte écologique en utilisant 100 % de carton recyclé.

Si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. Appelez-nous sans frais : 1-800-361-6323, lundi au samedi, de 8 h à 17 h, heure de l'Est. Ou visitez hcp.meadjohnson.com (Site Web du produit américain. En anglais seulement).

Pour le Canada : 1 800 361-6323
Enfamil.ca