

Titreringsfase

UPTRAVI®
filmovertrukne tabletter
selexipag

Formålet med titrering er at finde den rette individuelle dosis til den enkelte patient. Det sker som regel i løbet af 8 uger.



200 mikrogram tablet



800 mikrogram tablet

Titreringspakke*

Start med 200 mikrogram to gange dagligt, hver 12. time. Tabletterne tages i forbindelse med et måltid for at forbedre tolerabiliteten. Den første tablet bør tages om aftenen.

Reducering af antal administrerede tabletter†

Hvis der er behov for en dosis over 800 mikrogram, kan patienten gives:

Endnu en titreringspakke med UPTRAVI 200 mikrogram.

En pakke med UPTRAVI 800 mikrogram tabletter.

Optitrering

Øg dosis med 200 mikrogram to gange dagligt. Hvert doseringstrin varer omkring en uge, men kan vare længere. Den første dosis på hvert trin bør tages om aftenen.

Patient opfølgning

Forøg dosis yderligere, indtil patienten får utålelige eller medicinsk uhåndterbare bivirkninger‡.

Nedtrapning

Hvis en patient oplever utålelige eller der ses medicinsk uhåndterbare bivirkninger, reduceres dosis til foregående niveau.

Maksimal dosis

1600 mikrogram to gange dagligt er den højeste dosis, der bør gives til en patient.

Vedligeholdelsesfase

Den højeste tolererede dosis vil udgøre den individuelle vedligeholdelsesdosis og kan erstattes af en enkelt tablet med den tilsvarende styrke to gange dagligt. Denne dosis bør aldrig overstige 1600 mikrogram to gange dagligt.

Tabletterne er ikke gengivet i naturlig størrelse.

*Titreringspakken indeholder 140 UPTRAVI 200 mikrogram filmovertrukne tabletter. Det er nok tabletter til optitrering til 800 mikrogram.

†De 2 pakker indeholder nok tabletter til optitrering til 1600 mikrogram.

‡De mest almindelige bivirkninger, som dine patienter kan opleve under behandlingen med UPTRAVI, er: hovedpine, diarré, kvalme og opkastning, smerter i kæben, myalgi, ekstremitetssmerter, artralgi og blussen. Du kan se en komplet liste over bivirkninger i produktresuméet.

Læs venligst den fulde ordinationsinformation vedrørende dosis, dosisjustering og andre informationer.

Opstart af behandling

Behandling med UPTRAVI bør kun indledes og monitoreres af en læge med erfaring i behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH).

Patientens titreringspakke indeholder:

- UPTRAVI 200 mikrogram filmovertrukne tabletter til titrering.
- En titreringsvejledning til patienter, der indeholder en forklaring af titreringsprocessen og en dagbog til daglig registrering af antallet af indtagne tabletter.

Bemærk! For at reducere antal administrerede tabletter under titreringsfasen hos patienter, der har brug for en dosis over 800 mikrogram, kan sådanne patienter gives endnu en titreringspakke med UPTRAVI 200 mikrogram og en pakke med UPTRAVI 800 mikrogram tabletter.

Kommunikation med patienten

- I forbindelse med opstart af behandlingen skal du gennemgå titreringsvejledningen med patienterne for at sikre, at de har forstået denne proces fuldstændigt og er forberedte, hvis de får bivirkninger.
- Kontakt dine patienter hver uge i titreringsperioden for at tale med dem om deres fremskridt og sikre, at eventuelle farmakologiske bivirkninger bliver behandlet effektivt.
- Bivirkninger forbundet med UPTRAVIs farmakologiske virkning, såsom hovedpine, diarré, smerter i kæben, kvalme, myalgi, opkastning, ekstremitetssmerter, blussen og artralgi, er hyppige, især i fasen med individuel dosistitrering.
- Forventede farmakologiske bivirkninger er som regel forbigående eller tålelige med symptomatisk behandling.
- I klinisk praksis har gastrointestinale (GI) hændelser vist sig at respondere på diarréhæmmende, antiemetiske og kvalmestillende lægemidler og/eller lægemidler mod funktionelle gastrointestinale forstyrrelser. Smerterelaterede hændelser er ofte blevet behandlet med analgetika (såsom paracetamol).

Vedligeholdelse

- Når en vedligeholdelsesdosis er nået, kan der ordineres en enkelt tablet med den tilsvarende tabletstyrke til den individuelle vedligeholdelsesdosis (der fås tabletter på 200–1600 mikrogram).
- På den måde skal patienten kun tage én tablet om morgenen og én om aftenen.
- Patienterne er forskellige, og de vil ikke ende med at få samme vedligeholdelsesdosis. Ingen dosis bør overstige 1600 mikrogram to gange dagligt.

Tabletterne med de enkelte vedligeholdelsesdoser har forskellige farver og er præget med et tal på overfladen, der angiver dosen (i hundrede mikrogram).

Tabletterne er ikke gengivet i naturlig størrelse.
© 2020 Janssen Pharmaceuticals Ltd.



UPTRAVI®
filmovertrukne tabletter
selexipag