

Simponi patientkort

Dette patientkort indeholder vigtig sikkerhedsinformation, som du skal være opmærksom på før og under behandling med Simponi.

Vis dette kort til enhver læge, der er involveret i din behandling.

1. Infektioner

Når du bliver behandlet med Simponi, kan du muligvis lettere få infektioner. Infektioner kan udvikle sig hurtigere og kan være mere alvorlige. Endvidere kan tidligere infektioner dukke op igen.

1.1 Før behandling med Simponi

- Fortæl det til din læge, hvis du har en infektion. Du må ikke blive behandlet med Simponi, hvis du har tuberkulose (TB) eller andre alvorlige infektioner.
- Du skal undersøges for TB. Det er meget vigtigt, at du fortæller din læge, hvis du nogensinde har haft tuberkulose, eller hvis du har været i tæt kontakt med en person, som har haft TB. Du skal bede din læge om at notere type og dato for din(e) seneste undersøgelse(r) for TB nedenfor:
Test _____ Test _____
Dato _____ Dato _____
Resultat _____ Resultat _____
- Fortæl det til din læge, hvis du ved eller har mistanke om, at du er bærer af hepatitis B-virus.

1.2 Under og efter behandling med Simponi

- Fortæl det straks til din læge, hvis du har tegn på en infektion. Tegn inkluderer feber, træthedsfølelse, (vedvarende) hoste, åndenød, eller influenzalignende symptomer, vægttab, natlig svedtendens, diarré, sår, tandproblemer eller en brændende smerte, når du lader vandet.

2. Graviditet og vaccinationer

Hvis du har fået Simponi, mens du var gravid, er det vigtigt, at du informerer dit barns læge om det, før dit barn bliver vaccineret. Dit barn må ikke få en "levende vaccine", fx BCG (bruges til at forebygge tuberkulose) inden for 6 måneder efter din sidste Simponi-injektion under graviditeten.

3. Datoer for behandling med Simponi

1. indsprøjtning: _____

Efterfølgende indsprøjtninger: _____

Det er vigtigt, at du og din læge registrerer produktnavn og lot-nummer på din medicin.

4. Anden information

Patientens navn: _____
Lægens navn: _____
Lægens telefonnummer: _____

- Sørg for at du har en liste over al anden medicin, som du anvender når du besøger en sundhedsprofessionel.
- Du skal gemme dette kort i 6 måneder efter seneste Simponi-indsprøjtning, da bivirkninger kan optræde lang tid efter din sidste Simponi indsprøjtning.
- Læs indlægssedlen for Simponi grundigt, inden du begynder at tage medicinen.