

Remicade

infliximab

Patientinformationskort

Patientens navn:

Lægens navn:

Lægens telefonnummer:

Dette patientinformationskort indeholder vigtig sikkerhedsinformation, som du skal være opmærksom på før og under behandling med Remicade.

Vis dette kort til enhver læge, der er involveret i din behandling.

Læs indlægssedlen for Remicade grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Dato for start af Remicade-behandling:

Nuværende doseringer:

Det er vigtigt, at du og din læge noterer produktnavn og lot-nummer på din medicin.

Du skal bede din læge om at notere type og dato for seneste screening(er) for tuberkulose (TB) nedenfor:

Test	Test
Dato	Dato
Resultat:	Resultat:

Du skal sikre dig, at du ved hvert lægebesøg også medbringer en liste over alle andre lægemidler, som du bruger.

Liste over allergier:

Liste over anden medicin:

Infektioner

Før behandling med Remicade

- Fortæl din læge, hvis du har en infektion, også selvom det er en meget let infektion.
- Det er meget vigtigt, at du fortæller din læge, hvis du nogensinde har haft tuberkulose (TB), eller hvis du har været i tæt kontakt med en person, som har haft TB. Din læge vil teste dig for at se, om du har haft TB. Du skal bede din læge om at notere type og dato for din(e) seneste screening(er) for TB på kortet.
- Fortæl din læge, hvis du har hepatitis B, eller hvis du ved eller har mistanke om, at du er bærer af hepatitis B-virus.

Under behandling med Remicade

- Fortæl straks din læge, hvis du har tegn på en infektion. Tegn inkluderer feber, træthedsfølelse, (vedvarende) hoste, åndenød, vægttab, natlig svedtendens, diarré, sår, tandproblemer, en brændende smerte, når du lader vandet, eller influenzalignende symptomer.

Graviditet, amning og vaccinationer

- Hvis du har fået Remicade, mens du var gravid, eller hvis du ammer, er det vigtigt, at du informerer dit barns læge om det, før dit barn bliver vaccineret. Dit barn må ikke få en "levende vaccine", fx BCG (bruges til at forebygge tuberkulose) inden for 12 måneder efter fødslen, eller mens du ammer, medmindre barnets læge anbefaler noget andet.

Opbevar dette kort på dig i 4 måneder, efter du har fået din sidste dosis Remicade, eller i tilfælde af graviditet i 12 måneder, efter du har født. Bivirkninger kan forekomme lang tid efter sidste dosis.