





XEPLION[®] VE TREVICTA[®] ATLANAN DOZLARIN YÖNETİMİ



TREVICTA® 3 ayda bir düzenli uygulama zamanından +/- 15 gün içinde uygulanabilir.²

Son uygulamadan itibaren geçen süre¹ > 3,5 - 4 ay	 Doz mümkün olan en kısa sürede uygulanmalıdır, daha sonra 3 ayda bir uygulamaya devam edilmelidir.			
Son uygulamadan itibaren geçen süre¹ 4 - 9 ay	Son TREVICTA® dozu aşağıdaki gibiyse:	XEPLION®'u aşağıdaki şekilde uygulayın. 2 doz, 1 hafta arayla (deltoid kasa)	TREVICTA'yı aşağıdaki şekilde uygulayın (deltoid veya gluteal kasa)	
	175 mg	1. GÜN	8. GÜN	8. GÜNDEN 1 AY SONRA
	263 mg	50 mg	50 mg	175 mg
	350 mg	75 mg	75 mg	263 mg
	525 mg	100 mg	100 mg	350 mg
Son uygulamadan itibaren geçen süre¹ > 9 ay	 Tedaviyi XEPLION® ile yeniden başlatın. Stabil olduktan sonra TREVICTA®'ya geçin.			



ŞİZOFRENİ
TEDAVİSİNDE
ERKEN ÇÖZÜM^{1,4}



YILDA 12 ENJEKSİYON¹



XEPLION®
Kısa Ürün Bilgisi için
QR kodu okutunuz.



ŞİZOFRENİ
TEDAVİSİNDE
**REMİSYON
DEVAMLILIĞI**^{2,5}



YILDA 4 ENJEKSİYON²



TREVICTA®
Kısa Ürün Bilgisi için
QR kodu okutunuz.



ER: Uzatılmış salımlı.
Referanslar: 1. XEPLION® Kısa Ürün Bilgisi. 2. TREVICTA® Kısa Ürün Bilgisi. 3. Erişim Adresi: <https://www.medicalcloud.janssen.com.tr/assets/bltc2900d6394f0d3c5/blt4d2d97f685de8103/611d515bd618a80f3f6a8e1f/xepliona-gecis-dozyonetimi.pdf> Erişim Tarihi: 08.08.2023. 4. Emsley R. et al. Neuropsychiatric Disease and Treatment 2017;13 2261-2269. 5. Gorwood P. et al. J Psychiatr Res 2019; 281:112560.

