



# XEPLION<sup>®</sup> VE TREVICTA<sup>®</sup>'YA GEÇİŞ - DOZ PLANLAMASI



## XEPLION® FORMLARI



## TREVICTA® FORMLARI



## DOZ KARŞILIKLARI<sup>1,2</sup>

### SON XEPLION® DOZU:

50 MG

75 MG

100 MG


### TREVICTA®'YI SON XEPLION® DOZUNA KARŞILIK GELEN DOZDA BAŞLATIN:

● 175 MG

● 263 MG

● 350 MG

# TREVICTA® PLANI<sup>1,2</sup>



**XEPLION®, paliperidon veya risperidon ile stabilize olan yetişkin hastalarda şizofreninin idame tedavisi için endikedir.** Şizofrenisi olan ve daha önce oral paliperidon veya risperidona yanıt vermiş seçili yetişkin hastalarda, psikotik semptomlar hafif ila orta şiddetteyse ve bir uzun etkili enjektabl tedaviye ihtiyaç varsa, öncesinde oral tedaviyle stabilizasyon olmaksızın XEPLION® kullanılabilir.<sup>1</sup>

Bir **3 aylık** enjeksiyon olan TREVICTA®, **1 aylık paliperidon palmitat enjektabl** ürünle klinik olarak stabil olan yetişkin hastalarda **şizofreninin idame tedavisi için endikedir.**<sup>2</sup>

\* 1. ve 8. günde uygulanan başlatma dozları, ek oral antipsikotik desteği kullanılmadan hızlı bir şekilde kararlı durum terapötik konsantrasyonlar elde etmek için uygulanır.<sup>1</sup>

† Hastalar, tercihen **dört ay veya daha uzun** süreyle ve **doz ayarlaması gerektirmeden**, ayda bir kere XEPLION® ile yeterince tedavi edildiklerinde ve klinik olarak stabil olduklarında, TREVICTA® tedavisine geçiş yapabilirler.<sup>2</sup>

# HASTALAR ORAL RİSPERİDON VEYA PALİPERİDONDAN **XEPLION®**'A NASIL GEÇİRİLİR?<sup>1,i</sup>



**Daha önce oral paliperidona veya risperidona yanıt veren yetişkin şizofreni hastalarında, uzun etkili enjektabl tedavi gerekiyorsa, oral tedaviyle stabilizasyon sağlanmaksızın XEPLION® kullanılabilir.<sup>1</sup>**

**1. gün ve 8. gün başlangıç dozlarının ardından, idame tedavisi sırasında benzer kararlı durum paliperidon maruziyeti elde etmek için gerekli oral paliperidon / risperidon ve XEPLION® dozları<sup>1</sup>**

<b>Daha önce alınan oral paliperidon dozu: ➤</b>	<b>XEPLION® dozu:</b>
3 mg/gün	Aylık 50 mg
6 mg/gün	Aylık 75 mg
9 mg/gün	Aylık 100 mg
12 mg/gün	Aylık 150 mg

<b>Daha önce alınan oral risperidon dozu: ➤</b>	<b>XEPLION® dozu:</b>
2 mg/gün	Aylık 50 mg
3 mg/gün	Aylık 75 mg
4 mg/gün	Aylık 100 mg
6 mg/gün ve üzeri	Aylık 150 mg

i. Şizofreni hastalarının XEPLION®'a geçişi ile ilgili bilgiler için lütfen XEPLION® Kısa Ürün Bilgisi'ne bakınız.

## XEPLION® Uygulamas<sup>1</sup> (Invega®'dan Geçiş)

1. Gün

150 mg  
Deltoid

8. Gün

100 mg  
Deltoid

Daha önce kullanılmakta olan oral paliperidon ya da oral risperidon, paliperidon palmitat tedavisi başlatıldığında kesilebilir.

Önceki Invega® Dozu	XEPLION® İdame Dozu
günde 3 mg	ayda bir defa 50 mg
günde 6 mg	ayda bir defa 75 mg
günde 9 mg	ayda bir defa 100 mg
günde 12 mg	ayda bir defa 150 mg

## XEPLION® Uygulamas<sup>1</sup> (Risperdal Consta®'dan Geçiş)

- 1. gün / 8. gün başlangıç doz rejimi gerekli değildir.
- Doğrudan Consta® uygulama gününde XEPLION® aylık eşdeğer doz uygulanabilir.

Önceki RLAI Dozu	Paliperidon Palmitat İdame Dozu
2 haftada bir 25 mg	ayda bir defa 50 mg
2 haftada bir 37,5 mg	ayda bir defa 75 mg
2 haftada bir 50 mg	ayda bir defa 100 mg

## XEPLION® Uygulamas<sup>1</sup>

(Oral Atipik Antipsikotiklerden XEPLION®'a Geçiş)

Önceki Oral Antipsikotik İlaç	Hasta Sayısı	Önceki Antipsikotiğin Ortalama Günlük Dozu	WHO DDD	Paliperidon Palmitatın İdame Dozu
Olanzapin	396	14,2 mg	10 mg	100 mg
Risperidon	694	4,3 mg	4 mg	100 mg
Ketiapin	173	485 mg	400 mg	100 mg
Aripiprazol	141	19,4 mg	15 mg	100 mg


DDD: Tanımlanmış günlük doz

## XEPLION® Uygulamas<sup>1</sup>

(Oral Atipik Antipsikotiklerden XEPLION®'a Geçiş)

- Diğer antipsikotik ilaçlar ilgili prospektüs bilgilerine uygun şekilde kesilmelidir. Önceki antipsikotiğin farmakolojik profili (özellikle sedatif ve/veya antikolinergik özellikler\*) göz önünde bulundurulmalıdır.

Paliperidon ER  
Risperidon  
Aripiprazol  
Amisülprid  
Ziprasidon  
Yüksek güçlü geleneksel AP'ler





ŞİZOFRENİ  
TEDAVİSİNDE  
**ERKEN ÇÖZÜM**<sup>1,4</sup>



YILDA 12 ENJEKSİYON<sup>1</sup>



XEPLION®  
Kısa Ürün Bilgisi için  
QR kodu okutunuz.



ŞİZOFRENİ  
TEDAVİSİNDE  
**REMİSYON  
DEVAMLILIĞI**<sup>2,5</sup>



YILDA 4 ENJEKSİYON<sup>2</sup>



TREVICTA®  
Kısa Ürün Bilgisi için  
QR kodu okutunuz.



**ER:** Uzatılmış salımlı.  
**Referanslar:** 1. XEPLION® Kısa Ürün Bilgisi. 2. TREVICTA® Kısa Ürün Bilgisi. 3. Erişim Adresi: <https://www.medicalcloud.janssen.com.tr/assets/bltc2900d6394f0d3c5/blt4d2d97f685de8103/611d515bd618a80f3f6a8e1f/xepliona-gecis-dozyonetimi.pdf> Erişim Tarihi: 08.08.2023. 4. Emsley R. et al. Neuropsychiatric Disease and Treatment 2017;13 2261-2269. 5. Gorwood P. et al. J Psychiatr Res 2019; 281:112560.

