



SEX CAN BE FUN.
SEXUALLY TRANSMITTED AND
BLOOD-BORNE INFECTIONS?
NOT SO MUCH.

GONORRHEA

WHAT IT IS AND WHAT YOU CAN DO ABOUT IT

Gonorrhea is one of the most common sexually transmitted and blood-borne infections (STBBIs) in the world. It can affect the cervix, uterus and fallopian tubes in women, and the urethra as well as the membranes of the mouth, throat, eyes and rectum in both men and women.

Safe sex can help prevent the spread of gonorrhea and it can be cured with the right medical treatment – but permanent damage cannot be undone.

HOW CAN YOU PREVENT IT?

Safe sex can lead to great sex! Using condoms correctly and consistently every time you have sex can help prevent the spread of gonorrhea, and it is safest to have sex with someone who has been tested for STBBIs and has negative results.

HOW DOES IT AFFECT YOU?

Most men who have gonorrhea will develop symptoms, while most women will not. If left untreated, it can lead to very serious health problems – it can affect your ability to have children and cause long-term pain. If it spreads to your blood or joints, it can be life-threatening. Here are some things to look for:

Female and male: Pain or burning when urinating

Anus:

- Pain or itching
- Bleeding
- Mucus discharge

Eyes:

- Redness
- Itching
- Discharge

Throat:

- Throat infection

Female:

- Vaginal bleeding or discharge
- Abdominal or lower back pain
- Pain during sex

Male:

- A thick white, yellow or green discharge from penis
- Pain or swelling in the testicles
- Itchy penis

HOW IS GONORRHEA SPREAD?

Gonorrhea can be spread through unprotected oral, vaginal or anal sex with someone who has gonorrhea – even if there is no penetration and ejaculation.

LET'S MAKE SAFE CHOICES!

Sexually active young people are at the highest risk of getting gonorrhea.

1/2

of new cases
happen to
15 to 24
year-olds



Talk to your healthcare provider
or sexual health educator about
preventing, testing and treating STBBIs.



LE SEXE, C'EST LE FUN.

LES INFECTIONS TRANSMISSIBLES
SEXUELLEMENT ET PAR LE SANG?

PAS FULL.

LA GONORRHÉE

C'EST QUOI ET QUOI FAIRE QUAND TU L'ATTRAPES

La gonorrhée est une des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) les plus répandues au monde. Elle peut infecter le col de l'utérus, l'utérus et les trompes de Fallope chez la femme, et l'urètre ainsi que certaines parties de la bouche, de la gorge, des yeux et du rectum chez l'homme et la femme.

Des rapports sexuels protégés aident à prévenir la transmission de la gonorrhée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle peut se guérir à l'aide d'antibiotiques. Cependant, elle peut aussi causer des dommages irréversibles.

COMMENT PRÉVENIR LA GONORRHÉE?

Faire l'amour en se protégeant, c'est encore mieux! Utiliser des condoms à chaque relation sexuelle aide à prévenir la transmission de la gonorrhée. Et c'est encore plus sécuritaire d'avoir des relations sexuelles avec un partenaire qui a fait un dépistage ITSS et a reçu des résultats négatifs.

FAISONS DES CHOIX SÉCURITAIRES!

Les jeunes actifs sexuellement sont les plus à risque de contracter la gonorrhée.

COMMENT SAVOIR SI J'AI LA GONORRHÉE?

La majorité des hommes qui ont la gonorrhée auront des symptômes, alors que la plupart des femmes n'en auront pas. Si l'infection n'est pas traitée rapidement, elle peut entraîner de graves complications. Si elle se propage dans ton sang ou tes artères, elle peut être un réel danger pour ta vie. Voici quelques symptômes à surveiller :

Femme et homme :

Douleur ou sensation de brûlure en urinant

Anus :

- Douleur ou démangeaisons
- Saignement
- Écoulement de mucus

Yeux :

- Rougeurs
- Démangeaisons
- Écoulement

Gorge :

- Infection de la gorge

Femme :

- Saignements ou écoulements vaginaux
- Douleur abdominale ou dans le bas du dos
- Douleur pendant la relation sexuelle

Homme :

- Écoulement épais blanc, jaune ou vert du pénis
- Douleur ou inflammation des testicules
- Démangeaisons du pénis

COMMENT SE TRANSMET LA GONORRHÉE?

La gonorrhée peut être transmise lors de relations sexuelles orales, vaginales ou anales non protégées avec un partenaire qui en est infecté – même s'il n'y a pas de pénétration ou d'éjaculation.

50 %

des nouveaux
cas ont entre
15 et 24 ans



Parle à ton professionnel de la santé ou à ton éducateur en santé sexuelle à propos de la prévention, du dépistage et des traitements des ITSS.