

Foglio illustrativo: Informazioni per l'utente

Pariet 10 mg compresse gastroresistenti

Pariet 20 mg compresse gastroresistenti

Rabeprazolo sodico

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista
- Questo medicinale è stato prescritto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i loro sintomi sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati elencati peggiora, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio, informi il medico o il farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Pariet e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Pariet
3. Come prendere Pariet
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Pariet
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Pariet e a che cosa serve

Le compresse di Pariet contengono rabeprazolo sodico come principio attivo. Questo principio attivo appartiene ad una classe di medicinali chiamati Inibitori di Pompa Protonica (IPP). Agiscono diminuendo la quantità di acido che il suo stomaco produce.

Le compresse di Pariet sono usate per il trattamento delle seguenti malattie:

- “Malattia da reflusso gastroesofageo” (MRGE), che può includere pirosi. La malattia da reflusso gastroesofageo si manifesta quando l'acido ed il cibo passa dallo stomaco all'esofago.
- Ulcera dello stomaco o della parte alta dell'intestino. Se queste ulcere sono infettate da un batterio chiamato *Helicobacter pylori* (H. Pylori) le verranno prescritti anche antibiotici. L'utilizzo delle compresse di Pariet insieme agli antibiotici permette l'eliminazione dell'infezione e la guarigione dell'ulcera. Inoltre, la terapia permette di bloccare l'infezione e fa in modo che l'ulcera non ricompaia.
- Sindrome di Zollinger-Ellison, quando lo stomaco produce una quantità estremamente elevata di acido.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Pariet

Non prenda Pariet

- Se è allergico/a (ipersensibile) al rabeprazolo sodico o ad uno qualsiasi degli eccipienti di questo medicinale (elencati nel paragrafo 6).
- Se è o pensa di essere incinta.
- Se sta allattando.

Non assuma Pariet se una delle condizioni qui sopra la riguardano. Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al suo medico o al farmacista prima di prendere Pariet compresse.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Pariet:

- se è allergico ad altri inibitori di pompa protonica o “sostituti imidazolici”
- se ha problemi al fegato o al sangue; tali problemi si sono avuti in alcuni pazienti e si sono risolti con l’interruzione del trattamento con Pariet
- se le è stato diagnosticato un tumore allo stomaco
- se ha avuto malattie al fegato
- se sta prendendo atazanavir, per infezioni da HIV
- se ha ridotte riserve corporee o fattori di rischio che riducono l’assorbimento di vitamina B12 e riceve un trattamento a lungo termine con rabeprazolo sodico. Come tutti gli altri agenti che riducono l’acido, il rabeprazolo sodico può portare a un ridotto assorbimento di vitamina B12.
- se ha mai avuto una reazione cutanea dopo il trattamento con un medicinale simile a Pariet che riduce l'acidità gastrica.
- se nota la comparsa di un eritema cutaneo, soprattutto nelle zone esposte ai raggi solari, si rivolga al medico il prima possibile, poiché potrebbe essere necessario interrompere la terapia con Pariet. Si ricordi di riferire anche eventuali altri effetti indesiderati quali dolore alle articolazioni.
- se deve sottoporsi ad uno specifico esame del sangue (Cromogranina A).
- Durante l'assunzione di rabeprazolo, può verificarsi un'inflammatione ai reni. Segni e sintomi possono includere diminuzione del volume di urina o sangue nelle urine e/o reazioni di ipersensibilità come febbre, eruzione cutanea e rigidità articolare. Deve segnalare tali segni al medico curante.

In caso di dubbio che una qualsiasi delle condizioni sopra elencate possa verificarsi anche a lei, si rivolga al suo medico o al farmacista prima di prendere Pariet compresse.

Bambini

L’uso di Pariet non è raccomandato nei bambini.

Se ha diarrea in forma severa (acquosa o con sangue) con sintomi come febbre, dolore o dolorabilità addominale, interrompa l’assunzione di Pariet e **si rivolga al suo medico**.

Se assume un inibitore di pompa protonica come PARIET, specialmente per un periodo superiore ad un anno, si potrebbe verificare un lieve aumento del rischio di fratture dell’anca, del polso o della colonna vertebrale. Se soffre di osteoporosi o sta assumendo corticosteroidi (che possono aumentare il rischio di osteoporosi) consulti il medico.

Altri medicinali e Pariet

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, compresi quelli senza prescrizione medica o prodotti erboristici.

In particolare, informi il suo medico o il farmacista se sta prendendo uno qualsiasi dei seguenti medicinali:

- Ketoconazolo o itraconazolo – usati per il trattamento delle infezioni fungine. Pariet potrebbe diminuire la quantità di questi medicinali nel sangue. Il suo medico potrebbe ritenere opportuno modificare il dosaggio.
- Atazanavir – usato per il trattamento delle infezioni da HIV. Pariet potrebbe diminuire la quantità di questo medicinale nel sangue e non devono essere usati insieme.
- Metotrexato (un medicinale chemioterapico usato ad alte dosi per trattare i tumori) – se sta assumendo una alta dose di metotrexato, il medico può interrompere temporaneamente il suo trattamento con Pariet.

In caso di dubbio che una qualsiasi delle condizioni sopra elencate possa verificarsi anche a lei, si rivolga al suo medico o al farmacista prima di prendere Pariet compresse.

Gravidanza, allattamento e fertilità

- Non usi Pariet se è in gravidanza o pensa di esserlo.
- Non usi Pariet se sta allattando o sta pianificando l'allattamento.

Se è incinta o sta allattando, se pensa di essere incinta o sta pianificando una gravidanza, chiedi consiglio al tuo medico o al farmacista prima di assumere questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Durante l'assunzione di Pariet potrebbe sentirsi assonnato. Se ciò dovesse accadere, non guidi e non usi strumenti o macchinari.

Pariet contiene sodio

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol di sodio (23 mg) per compressa gastro-resistente, questo per dire che è essenzialmente "senza sodio".

3. Come prendere Pariet

Prenda sempre questo medicinale seguendo esattamente le istruzioni fornite dal suo medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Assunzione di Pariet

- Rimuova la compressa dal blister appena prima dell'assunzione.
- Deglutisca la compressa intera con un bicchiere d'acqua. Non mastichi o frantumi le compresse.
- Il suo medico le darà informazioni su quante compresse prendere e per quanto tempo. Questo dipenderà dalle sue condizioni.
- Se assume il medicinale per un periodo di tempo prolungato, il suo medico dovrà tenerla sotto controllo.

Adulti e Anziani

"Malattia da reflusso gastroesofageo" (MRGE)

Trattamento dei sintomi da moderati a gravi (MRGE sintomatica)

- La dose raccomandata è di 1 compressa di Pariet 10 mg una volta al giorno per quattro settimane.
- Prenda la compressa al mattino prima di colazione.
- Se la sintomatologia si ripresenta dopo 4 settimane di trattamento, il suo medico può decidere di continuare il trattamento con 1 compressa di Pariet 10 mg per il tempo che riterrà necessario.

Trattamento dei sintomi più gravi (MRGE erosiva o ulcerativa)

- La dose raccomandata è di 1 compressa di Pariet 20 mg una volta al giorno per 4-8 settimane.
- Prenda la compressa al mattino prima di colazione.

Trattamento a lungo termine dei sintomi (terapia di mantenimento della MRGE)

- La dose raccomandata è di 1 compressa di Pariet 10 mg o 20 mg una volta al giorno per il tempo indicato dal medico.
- Prenda la compressa al mattino prima di colazione.
- Il suo medico la vorrà rivedere ad intervalli regolari per valutare i sintomi ed il dosaggio.

Trattamento dell'ulcera dello stomaco (ulcera peptica)

- La dose raccomandata è di 1 compressa di Pariet 20 mg una volta al giorno per sei settimane.
- Prenda la compressa al mattino prima di colazione.
- Il suo medico potrà prescriverle di continuare il trattamento per altre sei settimane se le sue condizioni non dovessero migliorare.

Trattamento dell'ulcera dell'intestino (ulcera duodenale)

- La dose raccomandata è di 1 compressa di Pariet 20 mg una volta al giorno per quattro settimane.
- Prenda la compressa al mattino prima di colazione.
- Il suo medico potrà prescriverle di continuare il trattamento per altre quattro settimane se le sue condizioni non dovessero migliorare.

Trattamento e prevenzione dell'ulcera causata da infezioni da H. Pylori

- La dose raccomandata è di 1 compressa di Pariet 20 mg due volte al giorno per sette giorni.
- Il suo medico le prescriverà di assumere anche antibiotici chiamati amoxicillina e claritromicina.

Per ulteriori informazioni sugli altri medicinali usati nel trattamento dell'infezione da *Helicobacter pylori*, consulti i relativi fogli illustrativi.

Trattamento della Sindrome di Zollinger-Ellison, condizione nella quale lo stomaco produce una quantità molto elevata di acido.

- Si raccomanda di iniziare il trattamento con 3 compresse di Pariet 20 mg una volta al giorno.
 - La dose può essere successivamente adattata dal medico in base alla sua risposta al trattamento.
- Se è in trattamento a lungo termine, dovrà vedere il suo medico ad intervalli regolari per controllare i sintomi e rivedere la dose.

Pazienti con problemi epatici.

Dovrà consultare il suo medico che adoterà particolare attenzione all'inizio del suo trattamento con Pariet e durante tutta la terapia.

Se prende più Pariet di quanto deve

Se dovesse prendere più compresse di quelle che le sono state prescritte, consulti il suo medico o il Pronto Soccorso dell'Ospedale più vicino. Porti sempre con sé le compresse o la confezione.

Se dimentica di prendere Pariet

- Se dimentica di assumere una dose, la prenda il più presto possibile, appena si ricorda. Comunque, se è già ora di prendere la dose successiva, salti la dose dimenticata e continui come al solito.
- Se dimentica di assumere il medicinale per più di 5 giorni, chiami il suo medico prima di assumere nuovamente il medicinale.
- Non prenda una dose doppia (due dosi nello stesso momento) per compensare la dimenticanza della compressa.

Se interrompe il trattamento con Pariet

Il sollievo dai sintomi in genere si manifesta normalmente prima che l'ulcera sia completamente guarita. **E' importante non interrompere l'assunzione delle compresse fino a quando non glielo comunica il suo medico.**

Se ha qualsiasi altro dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Gli effetti indesiderati sono generalmente di lieve entità e si risolvono senza sospendere l'assunzione del medicinale.

Interrompa il trattamento con Pariet e consulti immediatamente il suo medico se nota la comparsa di uno qualsiasi degli effetti indesiderati indicati qui di seguito – potrebbe aver bisogno di un trattamento urgente:

- Reazioni allergiche – i segni potrebbero comprendere: improvviso gonfiore del viso, respiro corto o pressione bassa, che potrebbero causare svenimento o collasso.
- Infezioni frequenti come infiammazione della gola o febbre o ulcere in bocca o in gola.
- Lividi o sanguinamenti che si verificano con facilità.

Questi effetti indesiderati sono rari (si verificano in meno di 1 su 1.000 persone).

- Gravi reazioni bollose della pelle o irritazioni o ulcere in bocca e in gola.

Questi effetti indesiderati sono molto rari (si verificano in meno di 1 su 10.000 persone).

Altri possibili effetti indesiderati:

Comuni (si verificano in meno di 1 su 10 persone)

- Infezioni
- Difficoltà ad addormentarsi
- Mal di testa o capogiri
- Tosse, raffreddore, rinorrea (“naso che cola”), infiammazione della gola (faringite)
- Effetti sullo stomaco o l’intestino come: dolore addominale, diarrea, flatulenza, nausea, vomito o stitichezza
- Dolore non specifico, dolore alla schiena
- Debolezza, sindrome simil-influenzale
- Polipi benigni nello stomaco

Non comuni (si verificano in meno di 1 su 100 persone)

- Nervosismo o sonnolenza
- Infezioni alle vie aeree inferiori (bronchiti)
- Naso chiuso e dolente (sinusiti)
- Secchezza della bocca
- Cattiva digestione o eruttazione
- Rash o rossore della pelle
- Dolore ai muscoli, alle gambe o alle articolazioni
- Fratture dell’anca, del polso e della colonna vertebrale
- Infezioni alla vescica (infezioni alle vie urinarie)
- Dolore al petto
- Brividi o febbre
- Disturbi al fegato (evidenziati dalle analisi del sangue).

Rari (si verificano in meno di 1 su 1.000 persone)

- Perdita di appetito (anoressia)
- Depressione
- Ipsensibilità (incluse reazioni allergiche)
- Disturbi della visione
- Infiammazione della bocca (stomatiti) o disturbi del gusto
- Disordini dello stomaco o dolore allo stomaco
- Problemi al fegato inclusi ingiallimento della pelle e del bianco degli occhi (ittero)
- Prurito cutaneo e formazione di vescicole
- Sudorazione
- Problemi renali
- Aumento di peso
- Modificazioni dei globuli bianchi nel sangue (evidenziati dalle analisi del sangue) che possono portare a frequenti infezioni

- Riduzione delle piastrine nel sangue che possono portare a sanguinamento o alla comparsa di lividi con più facilità del normale.

Altri possibili effetti indesiderati (frequenza non nota)

- Gonfiore del petto negli uomini
- Ritenzione di liquidi
- Bassi livelli di sodio nel sangue che possono portare a stanchezza, confusione, spasmi muscolari, convulsioni e coma
- Pazienti che hanno avuto precedenti problemi al fegato potrebbero manifestare, molto raramente, encefalopatia (malattia del cervello)
- Eritema, possibili dolori articolari
- Infiammazione dell'intestino (che provoca diarrea)

Se assume PARIET per più di tre mesi, è possibile che i livelli ematici di magnesio diminuiscano. Bassi livelli di magnesio possono manifestarsi con affaticamento, contrazioni muscolari involontarie, disorientamento, convulsioni, vertigini, aumento della frequenza cardiaca. Se ha qualcuno di questi sintomi consulti immediatamente il suo medico. Bassi livelli di magnesio possono anche comportare una riduzione dei livelli ematici di potassio o calcio. Il medico dovrebbe decidere se controllare periodicamente i livelli di magnesio nel sangue.

Non si lasci allarmare da questo elenco di effetti indesiderati. Potrebbe non manifestarne nessuno.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Pariet

Tenere Pariet fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Non refrigerare.

Non usi Pariet dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione e sul blister. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Pariet

Ogni compressa Pariet 10 mg contiene come principio attivo 10 mg di rabeprazolo sodico.

Gli eccipienti sono:

mannitolo, magnesio ossido, iprolosa a basso grado di sostituzione, iprolosa, magnesio stearato, etilcellulosa, ipromellosa ftalato, monogliceridi diacetilati, talco, titanio diossido (E171), ferro ossido rosso (E 172), cera carnauba ed inchiostro (gomma lacca bianca, ferro ossido nero (E172), alcol etilico disidratato, 1-butanol).

Ogni compressa Pariet 20 mg contiene come principio attivo 20 mg di rabeprazolo sodico.

Gli eccipienti sono:

mannitolo, magnesio ossido, iprolosa a basso grado di sostituzione, iprolosa, magnesio stearato, etilcellulosa, ipromellosa ftalato, monogliceridi diacetilati, talco, titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E 172) cera carnauba ed inchiostro (gomma lacca bianca, ferro ossido rosso (E 172), glicerina esterificata con acido grasso, alcol etilico disidratato, 1-butanolo).

Descrizione dell'aspetto di Pariet e contenuto della confezione

Pariet 10 mg compresse gastroresistenti è una compressa rosa, biconvessa con la scritta "E241" su un lato.

Pariet 20 mg compresse gastroresistenti è una compressa gialla, biconvessa con la scritta "E243" su un lato.

Le compresse sono confezionate in blister da 1,7,14,15,25,28,30,50,56,75 o 120 compresse. E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio e Produttore

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio

Janssen-Cilag SpA
Viale Fulvio Testi, 280/6
20126 Milano MI

Produttore

Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30,
2340 Beerse, Belgio

e/o

Eisai GmbH,

Edmund-Rumpler-Straße 3,
60549 Francoforte sul Meno
Germania

e/o

Lusomedicamenta – Sociedade Técnica Farmacêutica S.A.

Estrada Consiglieri Pedroso 66, 69 B
Queluz de Baixo
2730-055 Barcarena
Portogallo

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dell'Area Economica Europea e del Regno Unito (Irlanda del Nord) con i seguenti marchi:

Nome del Paese	Nome del medicinale	Nome del Paese	Nome del medicinale
Austria	Pariet	Italia	Pariet
Belgio	Alfence, Pariet	Lussemburgo	Pariet
Danimarca	Pariet	Olanda	Pariet
Finlandia	Pariet	Portogallo	Pariet
Francia	Alfence, Pariet	Spagna	Pariet
Germania	Pariet	Svezia	Pariet
Grecia	Pariet	Gran Bretagna	Pariet

Irlanda

Pariet

(Irlanda del Nord)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato 11/2023