

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

Topamax 15 mg capsule rigide

Topamax 25 mg capsule rigide

topiramato

▼ Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Lei può contribuire segnalando qualsiasi effetto indesiderato riscontrato durante l'assunzione di questo medicinale. Vedere la fine del paragrafo 4 per le informazioni su come segnalare gli effetti indesiderati.

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è Topamax e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Topamax
3. Come prendere Topamax
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Topamax
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è TOPAMAX e a cosa serve

Topamax appartiene ad un gruppo di medicinali denominati "medicinali antiepilettici". È impiegato:

- da solo per il trattamento di crisi epilettiche in adulti e bambini di età superiore ai 6 anni
- con altri medicinali per il trattamento di crisi epilettiche in adulti e bambini a partire dai 2 anni di età
- per prevenire l'emicrania negli adulti

2. Cosa deve sapere prima di prendere TOPAMAX

Non prenda Topamax

- se è allergico (ipersensibile) a topiramato o ad uno qualsiasi degli eccipienti di questo medicinale (elencati nel paragrafo 6).

Prevenzione dell'emicrania

- Non deve assumere Topamax se è incinta.
- Se lei è una donna che può rimanere incinta, non deve prendere Topamax a meno che non utilizzi un metodo contraccettivo altamente efficace (anticoncezionale) durante il trattamento. Vedere di seguito sotto "Gravidanza, allattamento e fertilità – Avviso importante per le donne".

Trattamento dell'epilessia

- Non deve assumere Topamax se è incinta, a meno che nessun altro trattamento riesca a offrirle controllo sufficiente sulle crisi convulsive.
- Se lei è una donna che può rimanere incinta, non deve prendere Topamax a meno che non utilizzi un metodo contraccettivo altamente efficace (anticoncezionale) durante il trattamento. L'unica eccezione è se Topamax rappresenta l'unico trattamento che le fornisce controllo sufficiente sulle crisi convulsive e sta pianificando una gravidanza. Deve rivolgersi al medico per accertarsi di aver ricevuto informazioni sui rischi dell'assunzione di Topamax durante la gravidanza e sui rischi di crisi convulsive durante la gravidanza. Vedere di seguito sotto "Gravidanza, allattamento e fertilità – Avviso importante per le donne".

Si accerti di aver letto la guida del paziente che riceverà dal medico (vedere paragrafo 6 "Altre fonti di informazione").

Una scheda di allerta per il paziente è fornita all'interno della confezione di Topamax per ricordarle i rischi durante la gravidanza.

Avvertenze e precauzioni

Consulti il medico prima di assumere Topamax se:

- ha problemi ai reni, in particolare, calcoli renali, o se è sottoposto a dialisi renale
- ha una storia di anomalie del sangue e dei liquidi dell'organismo (acidosi metabolica)
- ha problemi al fegato
- ha problemi agli occhi, in particolare glaucoma
- ha problemi di crescita
- il suo regime alimentare è ricco di grassi (dieta chetogena)
- è una donna che può rimanere incinta. Topamax può nuocere al feto se assunto durante la gravidanza. È necessario utilizzare un contraccettivo altamente efficace (anticoncezionale) durante il trattamento e per almeno 4 settimane dopo l'ultima dose di Topamax. Vedere paragrafo "Gravidanza e allattamento" per ulteriori informazioni.
- è incinta. Topamax può nuocere al feto se assunto durante la gravidanza.

Se non è sicura che quanto sopra la riguardi, si rivolga al medico prima di prendere Topamax.

Se soffre di epilessia, è importante che lei non smetta di prendere il medicinale senza consultare prima il medico.

Deve inoltre parlare con il medico prima di assumere qualsiasi medicinale a base di topiramato che le sia dato in alternativa a Topamax.

Con l'utilizzo di Topamax può perdere peso, quindi mentre assume questo medicinale, il suo peso deve essere controllato regolarmente. Se perde troppo peso o se un bambino che sta usando il medicinale non cresce abbastanza di peso, consulti il medico.

Un numero esiguo di persone trattate con medicinali antiepilettici come Topamax ha manifestato pensieri autolesivi o di suicidio. Nel caso in cui, in qualsiasi momento, abbia questo tipo di pensieri, contatti immediatamente il medico.

Topamax può causare gravi reazioni cutanee, informi immediatamente il medico se sviluppa un'eruzione cutanea e / o vesciche (vedere anche la sezione 4 "Possibili effetti indesiderati").

Topamax può in rari casi causare elevati livelli di ammoniaca nel sangue (vedere negli esami del sangue) che possono portare a un cambiamento nella funzione del cervello, soprattutto se si sta prendendo un medicinale chiamato acido valproico o sodio valproato. Dal momento che questa può

essere una condizione grave, informi immediatamente il medico se si verificano i seguenti sintomi (vedere anche il paragrafo 4 “Possibili effetti indesiderati”):

- difficoltà a pensare, a ricordare le informazioni o a risolvere i problemi
- essere meno vigile o consapevole
- sentirsi molto assonnato e con poca energia

A dosi più elevate di Topamax, il rischio di sviluppare questi sintomi può aumentare.

Altri medicinali e Topamax

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale. Topamax e alcuni medicinali di altro genere possono interagire gli uni con gli altri. Talvolta la dose di alcune delle medicine che sta assumendo o di Topamax dovrà essere aggiustata.

In particolare, informi il medico o il farmacista se sta prendendo:

- altri medicinali che compromettono o riducono pensiero, concentrazione, o coordinazione muscolare (p.es., medicinali depressivi del sistema nervoso centrale come rilassanti muscolari e sedativi).
- contraccettivi ormonali. Topamax può rendere i contraccettivi ormonali meno efficaci. È necessario utilizzare un metodo contraccettivo di barriera aggiuntivo come un preservativo o pessario/diaframma. Si rivolga al medico per discutere il metodo contraccettivo migliore da utilizzare mentre sta assumendo Topamax.

Riferisca al medico qualsiasi eventuale cambiamento nel suo flusso mestruale mentre sta assumendo contraccettivi ormonali e Topamax. Può verificarsi un flusso mestruale irregolare. In questo caso, continui a prendere i contraccettivi ormonali e ne parli con il medico.

Tenga un elenco di tutti i medicinali che assume. Mostri questo elenco al medico o al farmacista, prima di iniziare a prendere un nuovo medicinale.

Altri medicinali di cui parlare con il medico o con il farmacista comprendono altri medicinali antiepilettici, risperidone, litio, idroclorotiazide, metformina, pioglitazone, glibenclamide, amitriptilina, propranololo, diltiazem, venlafaxina, flunarizina, erba di San Giovanni (*Hypericum perforatum*) (una preparazione a base di erba usata per il trattamento della depressione), warfarin utilizzato per fluidificare il sangue.

Se non è sicuro che una delle condizioni citate in precedenza la riguardi, parli con il medico o il farmacista prima di usare Topamax.

Topamax con cibi e bevande

Può assumere Topamax durante o lontano dai pasti. Beva molti liquidi durante il giorno quando assume Topamax, per prevenire la formazione di calcoli renali. Durante il trattamento con Topamax deve evitare di bere alcol.

Gravidanza e allattamento

Informazioni importanti per le donne che possono rimanere incinte

Topamax può nuocere al feto. Se lei è una donna che può rimanere incinta, consulti il medico per discutere altri trattamenti possibili. Consulti il medico per rivalutare il trattamento e discutere i rischi almeno una volta all'anno.

Prevenzione dell'emicrania

- Per l'emicrania, non deve assumere Topamax se è incinta.
- Per l'emicrania, non deve prendere Topamax se lei è una donna che può rimanere incinta a meno che non stia utilizzando un metodo contraccettivo altamente efficace.

- Se la paziente è una donna che può rimanere incinta, è necessario eseguire un test di gravidanza prima di iniziare il trattamento con Topamax.

Trattamento dell'epilessia

- Per l'epilessia, non deve assumere Topamax se è incinta, a meno che nessun altro trattamento riesca a offrirle controllo sufficiente sulle crisi convulsive.
- Per l'epilessia, non deve prendere Topamax se lei è una donna che può rimanere incinta a meno che non stia utilizzando un metodo contraccettivo altamente efficace. L'unica eccezione è se Topamax rappresenta l'unico trattamento che le fornisce controllo sufficiente sulle crisi convulsive e sta pianificando una gravidanza. Deve rivolgersi al medico per accertarsi di aver ricevuto informazioni sui rischi dell'assunzione di Topamax durante la gravidanza e sui rischi di crisi convulsive durante la gravidanza, che possono comportare rischi per lei o per il feto.
- Se la paziente è una donna che può rimanere incinta, è necessario eseguire un test di gravidanza prima di iniziare il trattamento con Topamax.

Rischi associati al topiramato se assunto durante la gravidanza (a prescindere dalla malattia per la quale topiramato viene utilizzato):

L'uso di Topamax durante la gravidanza comporta rischi per il feto.

- Se prende Topamax durante la gravidanza, il suo bambino ha un rischio maggiore di sviluppare difetti congeniti. Circa 4-9 bambini su 100 nati da donne che assumono topiramato presentano difetti congeniti. Il numero si attesta a 1-3 su 100 per i bambini nati da donne che non soffrono di epilessia e non assumono un trattamento antiepilettico. In particolare, sono stati osservati labbro leporino (separazione del labbro superiore) e palatoschisi (separazione del palato). I neonati maschi possono anche presentare una malformazione nel pene (ipospadia). Questi difetti possono svilupparsi all'inizio della gravidanza, anche prima che lei venga a conoscenza di essere incinta.
- Se prende Topamax durante la gravidanza, il suo bambino può avere un rischio di 2-3 volte superiore di sviluppare disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettive, o disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) rispetto ai bambini nati da donne con epilessia che non assumono medicinali antiepilettici.
- Se prende Topamax durante la gravidanza, il suo bambino potrebbe essere più piccolo e pesare meno del previsto alla nascita. In uno studio, il 18% dei bambini nati da madri che assumevano topiramato durante la gravidanza era più piccolo e pesava meno del previsto alla nascita, rispetto al 5% dei bambini nati da madri senza epilessia e che non assumevano farmaci antiepilettici.
- Si rivolga al medico se ha domande in merito a questo rischio durante la gravidanza.
- Potrebbero esserci altri medicinali per trattare la sua patologia che presentano un rischio inferiore di difetti congeniti.

Necessità di metodi contraccettivi per le donne che possono rimanere incinte:

- Se lei è una donna che può rimanere incinta, consulti il medico per discutere altri trattamenti possibili in alternativa a Topamax. Se decide di utilizzare Topamax, deve assumere un contraccettivo altamente efficace durante il trattamento e per almeno 4 settimane dopo l'ultima dose di Topamax.
- È necessario utilizzare un metodo contraccettivo altamente efficace (come un dispositivo intrauterino) o due contraccettivi complementari come la pillola anticoncezionale assieme a un contraccettivo meccanico di barriera (come un preservativo o pessario/diaframma). Si rivolga al medico per discutere quale metodo contraccettivo sia più appropriato per lei.
- Se sta assumendo contraccettivi ormonali, è possibile che il contraccettivo ormonale abbia un'efficacia ridotta a causa del topiramato. Pertanto è necessario utilizzare un metodo contraccettivo meccanico di barriera aggiuntivo (come un preservativo o pessario/diaframma).
- Informi il medico in caso di flusso mestruale irregolare.

Uso di Topamax nelle ragazze:

Se lei è un genitore o un caregiver di una ragazza trattata con Topamax, deve contattare immediatamente il medico quando la ragazza ha il primo ciclo mestruale (menarca). Il medico la informerà in merito ai rischi sul feto provocati dall'esposizione al topiramato durante la gravidanza, e la necessità di utilizzare un contraccettivo altamente efficace.

Se desidera rimanere incinta mentre sta assumendo Topamax:

- Prenda un appuntamento con il suo medico.
- Non smetta di utilizzare il suo metodo contraccettivo senza parlarne prima con il medico.
- Se prende Topamax per l'epilessia, non smetta di utilizzarlo senza parlarne prima con il medico poiché la sua malattia potrebbe peggiorare.
- Il medico rivaluterà il trattamento e prenderà in considerazione opzioni terapeutiche alternative. Il medico la informerà sui rischi associati a Topamax durante la gravidanza. Potrebbe anche raccomandarla a un altro specialista.

Se rimane incinta o sospetta una gravidanza mentre sta assumendo Topamax:

- Prenda un appuntamento urgente con il suo medico.
- Se sta assumendo Topamax per prevenire l'emicrania, interrompa immediatamente l'uso del medicinale e contatti il medico per valutare la necessità di trattamenti alternativi.
- Se sta assumendo Topamax per l'epilessia, non smetta di prendere questo medicinale senza parlarne prima con il medico, poiché la sua malattia potrebbe peggiorare. L'aggravamento dell'epilessia potrebbe comportare rischi per lei o per il feto.
- Il medico rivaluterà il trattamento e prenderà in considerazione opzioni terapeutiche alternative. Il medico la informerà sui rischi associati a Topamax durante la gravidanza. Potrebbe anche raccomandarla a un altro specialista.
- Se assume Topamax durante la gravidanza, dovrà essere monitorata attentamente in modo da verificare lo sviluppo del feto.

Si accerti di aver letto la guida del paziente che riceverà dal medico (veda il paragrafo 6 "Altre fonti di informazioni"). Una scheda di allerta per il paziente è fornita all'interno della confezione di Topamax per ricordarle i rischi associati al topiramato durante la gravidanza.

Allattamento

La sostanza attiva in Topamax (topiramato) è escreta nel latte umano. Effetti sono stati osservati nei neonati allattati da madri trattate, tra cui diarrea, sensazione di sonnolenza, sensazione di irritabilità e scarso aumento di peso. Pertanto il medico discuterà con lei se rinunciare all'allattamento al seno o se rinunciare al trattamento con Topamax. Il medico prenderà in considerazione l'importanza del trattamento per la madre ed il rischio per il bambino.

Le madri che allattano con latte materno quando assumono Topamax devono informare il medico prima possibile se il bambino manifesta qualcosa di insolito.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Durante il trattamento con Topamax possono insorgere capogiro, stanchezza e problemi di vista. Non guidi, né usi strumenti o macchinari, senza prima averne parlato con il medico.

Topamax contiene saccarosio

Se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza agli zuccheri, contatti il medico curante prima di assumere il medicinale.

Altri componenti

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol di sodio (23 mg) per capsula, vale a dire che è essenzialmente "senza sodio".

3. Come prendere TOPAMAX

Assuma sempre questo medicinale seguendo esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

- Il medico le darà di solito una dose bassa di Topamax, per poi aumentarla lentamente fino ad individuare la dose migliore per lei.
- Le capsule rigide di Topamax possono essere inghiottite intere o aperte per versare il contenuto in un cucchiaino di cibo morbido di qualsiasi genere. Ad esempio: purea di mele, crema, gelato, pappa, budino o yogurt. Beva subito dopo dei liquidi in modo da essere sicuro di aver inghiottito tutta la miscela di cibo e farmaco.
- Tenga la capsula rigida dritta, in modo da poter leggere la parola "TOP"
- Sviti con attenzione la porzione trasparente della capsula. Può essere più semplice farlo su una piccola porzione di cibo su cui verserà poi i granuli.
- Versi tutto il contenuto della capsula nel cucchiaino di cibo morbido, facendo attenzione che l'intero dosaggio prescritto sia versato sul cibo.
- Si assicuri di inghiottire immediatamente l'intera miscela di granuli/cibo contenuta nel cucchiaino. Non masticare. Beva subito liquidi, per assicurarsi che tutta la miscela sia inghiottita.
- Non conservi mai la miscela di medicinale e cibo per usarla in un secondo tempo.
- Topamax può essere assunto prima, durante o dopo un pasto. Beva abbondantemente durante il giorno per evitare la formazione di calcoli renali, mentre assume Topamax.

Ragazze e donne che possono rimanere incinte:

Il trattamento con Topamax deve essere iniziato e supervisionato da un medico specialista nel trattamento dell'epilessia o dell'emicrania. Consulti il medico per rivalutare il trattamento almeno una volta all'anno.

Se prende più Topamax di quanto deve

- Consulti immediatamente un medico. Porti con sé la confezione del medicinale.
- Può sentirsi assonnato, stanco, o essere meno vigile; perdere la coordinazione; manifestare difficoltà a parlare o a concentrarsi; avere la vista doppia o offuscata; avere capogiri causati dalla bassa pressione arteriosa; sentirsi depressi o agitati; o avere dolore addominale o crisi.

Se sta assumendo altri medicinali insieme a Topamax, può verificarsi un sovradosaggio.

Se dimentica di prendere Topamax

- Se dimentica di prendere una dose, la assuma non appena se ne ricorda. Tuttavia, se è quasi l'ora della dose successiva, salti la dose dimenticata e continui come sempre. Se dimentica due o più dosi, contatti il medico.
- Non assuma una dose doppia (due dosi allo stesso tempo) per compensare la dose dimenticata.

Se interrompe il trattamento con Topamax

Non smetta di prendere questo medicinale, a meno che non glielo dica il medico. I suoi sintomi possono ripresentarsi. Se il medico decide di interrompere questo medicinale, la sua dose può essere diminuita gradualmente nel corso di alcuni giorni.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Informi il medico o si rivolga immediatamente al medico se manifesta uno dei seguenti effetti indesiderati:

Molto comune (può interessare più di 1 persona su 10)

- Depressione (nuova o peggioramento)

Comune (può interessare fino a 1 persona su 10)

- Crisi convulsive
- Ansia, irritabilità, cambiamenti dell'umore, confusione, disorientamento
- Problemi di concentrazione, lentezza del pensiero, perdita di memoria, problemi con la memoria (nuova insorgenza, cambio improvviso o aumento della gravità)
- Calcolo renale, minzione frequente o dolorosa

Non comune (può interessare fino a 1 persona su 100)

- Aumento del livello acido nel sangue (può causare disturbi della respirazione incluso respiro corto, perdita di appetito, nausea, vomito, eccessiva stanchezza e battiti cardiaci veloci o irregolari)
- Diminuzione o perdita di sudorazione (particolarmente nei bambini piccoli esposti ad alte temperature)
- Pensieri di grave autolesionismo, tentativo di grave autolesionismo
- Perdita di parte del campo visivo

Raro (può interessare fino a 1 persona su 1000)

- Glaucoma che consiste in una ritenzione di liquido nell'occhio che determina un'aumentata pressione oculare, dolore o diminuzione della vista
- Difficoltà a pensare, a ricordare le informazioni o a risolvere i problemi, essere meno vigile o consapevole, sentirsi molto assonnato e con poca energia - questi sintomi possono essere un segno di un elevato livello di ammoniaca nel sangue (iperammoniemia), che può portare a un cambiamento nella funzione del cervello (encefalopatia iperammoniemica)
- Reazioni cutanee gravi, come la sindrome di Stevens-Johnson e la necrolisi epidermica tossica - queste possono apparire come eruzioni cutanee con o senza vesciche. Irritazione della pelle, piaghe o gonfiore in bocca, gola, naso, occhi e intorno ai genitali. Le eruzioni cutanee possono svilupparsi in gravi e diffusi danni alla pelle (desquamazione dell'epidermide e delle mucose superficiali) con conseguenze pericolose per la vita.

Non noto (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

- infiammazione dell'occhio (uveite) con sintomi quali arrossamento, dolore, sensibilità alla luce, lacrimazione, vista offuscata o disturbata dalla comparsa di piccoli puntini davanti agli occhi

Altri effetti indesiderati includono i seguenti, se questi peggiorano consultare il medico o il farmacista:

Molto comune (può interessare più di 1 persona su 10)

- Naso chiuso, che cola o mal di gola
- Formicolio, dolore e/o intorpidimento di varie parti del corpo
- Sonnolenza, stanchezza
- Capogiro
- Nausea, diarrea
- Perdita di peso

Comune (può interessare fino a 1 persona su 10)

- Anemia (bassa conta di globuli rossi)
- Reazione allergica (come eruzione cutanea, rossore, prurito, gonfiore del viso, orticaria)
- Perdita dell'appetito, diminuzione dell'appetito
- Aggressività, agitazione, rabbia, comportamento anormale
- Difficoltà ad addormentarsi o a rimanere addormentato
- Problemi o disturbi del linguaggio, difficoltà a parlare
- Goffaggine o perdita di coordinazione, sensazione di instabilità quando si cammina
- Diminuzione dell'abilità nel compiere attività di routine
- Diminuzione, perdita, o nessun senso del gusto

- Tremori involontari o scuotimenti: movimenti degli occhi rapidi, incontrollabili
- Disturbi della vista come visione doppia, visione offuscata, diminuzione della vista, difficoltà a focalizzare
- Sensazione di giramento (vertigine), ronzio nelle orecchie, dolore all'orecchio
- Respiro corto
- Tosse
- Sanguinamenti dal naso
- Febbre, sensazione di malessere, debolezza
- Vomito, costipazione, dolore o disturbo addominale, indigestione, infezione allo stomaco o all'intestino
- Bocca secca
- Perdita dei capelli
- Prurito
- Dolore o gonfiore articolare, spasmi o contrazioni muscolari, dolori o debolezza muscolare, dolore toracico
- Aumento di peso

Non comune (può interessare fino a 1 persona su 100)

- Diminuzione delle piastrine (cellule del sangue che aiutano a fermare il sanguinamento), diminuzione dei globuli bianchi, che aiutano a proteggere dalle infezioni, diminuzione dei livelli di potassio nel sangue
- Aumento dei livelli degli enzimi epatici, aumento degli eosinofili (un tipo di globuli bianchi) nel sangue
- Gonfiore delle ghiandole del collo, delle ascelle o dell'inguine
- Aumento dell'appetito
- Miglioramento dell'umore
- Udire, vedere o sentire cose che non ci sono, gravi disturbi mentali (psicosi)
- Non mostrare e/o sentire emozioni, sospettosità inusuale, attacco di panico
- Problemi con la lettura, disturbo nel parlare, problemi nella scrittura
- Irrequietezza, iperattività
- Pensiero rallentato, diminuzione dello stato di veglia o di vigilanza
- Movimenti del corpo rallentati o diminuiti, movimenti muscolari involontari anormali o ripetitivi
- Svenimento
- Senso del tatto anormale o compromesso
- Senso dell'olfatto compromesso, distorto o assente
- Sensazione inusuale o sensazione che può precedere l'emicrania o un certo tipo di crisi
- Secchezza degli occhi, sensibilità degli occhi alla luce, spasmi delle palpebre e lacrimazione
- Diminuzione o perdita dell'udito, perdita dell'udito in un orecchio
- Battito cardiaco lento o irregolare, sentire il proprio battito nel petto
- Pressione sanguigna bassa, diminuzione della pressione quando ci si alza (di conseguenza, alcune persone che prendono Topamax possono sentirsi deboli, avere la testa che gira o possono svenire quando si alzano in piedi o si siedono improvvisamente)
- Vampate di calore, sentire caldo
- Pancreatite (infiammazione del pancreas)
- Eccessivo passaggio di gas o aria, bruciore allo stomaco, sensazione di pienezza o gonfiore addominale
- Gengive sanguinanti, aumento della saliva, perdita di saliva, alitosi
- Eccessiva assunzione di liquidi, sete
- Decolorazione della pelle
- Rigidità muscolare, dolore al fianco
- Sangue nell'urina, incontinenza (perdita di controllo) dell'urina, urgente necessità di urinare, dolore al fianco o al rene
- Difficoltà a raggiungere o a mantenere l'erezione, disfunzione sessuale

- Sintomi simili all'influenza
- Dita delle mani e dei piedi freddi
- Sensazione di ebbrezza
- Difficoltà di apprendimento

Raro (può interessare fino a 1 persona su 1000)

- umore elevato in modo anormale
- Perdita di coscienza
- Cecità in un occhio, cecità temporanea, cecità notturna
- Occhio pigro
- Gonfiore dentro e attorno agli occhi
- Intorpidimento, formicolio e cambiamento di colore (bianco, blu e poi rosso) delle dita delle mani e dei piedi quando sono esposti al freddo
- Infiammazione del fegato, insufficienza epatica
- Odore della pelle anormale
- Fastidio alle braccia o alle gambe
- Disturbo al rene

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

- Maculopatia, una malattia della macula, la piccola parte della retina nella quale la vista è più acuta. Se nota un cambiamento o una diminuzione della vista deve contattare il medico

Bambini

Gli effetti indesiderati nei bambini sono generalmente simili a quelli riscontrati negli adulti, ma i seguenti effetti indesiderati possono essere più comuni nei bambini rispetto agli adulti:

- Problemi di concentrazione
- Aumento del livello di acido nel sangue
- Avere pensieri di grave autolesionismo
- Stanchezza
- Diminuzione o aumento dell'appetito
- Aggressività, comportamento anormale
- Difficoltà ad addormentarsi o a rimanere addormentato
- Sensazione di instabilità quando si cammina
- Non sentirsi bene
- Diminuzione del livello di potassio nel sangue
- Non mostrare e / o non sentire emozioni
- Lacrimazione
- Battito cardiaco lento o irregolare

Altri effetti indesiderati che possono verificarsi nei bambini sono:

Comune (può interessare fino a 1 persona su 10)

- Sensazione di giramento (vertigini)
- Vomito
- Febbre

Non comune (può interessare fino a 1 persona su 100)

- Aumento degli eosinofili (un tipo di globuli bianchi) nel sangue
- Iperattività
- Sentire caldo
- Difficoltà di apprendimento

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazionireazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare TOPAMAX

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola/flacone dopo Scad. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Tenere il flacone ben chiuso per proteggere il medicinale dall'umidità.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Topamax

- Il principio attivo è topiramato.
- Ogni capsula rigida di Topamax contiene 15 e 25 mg di topiramato.
- Gli altri componenti di Topamax sono:
 - sfere di zucchero (amido di mais, saccarosio), povidone, acetato di cellulosa
 - capsula: gelatina, titanio diossido (E171)
 - inchiostro di stampa: inchiostro nero (ferro ossido nero (E172), gommalacca e glicole propilenico)

Descrizione dell'aspetto di Topamax e contenuto della confezione

- Capsula da 15 mg: piccoli granuli biancastri in capsula di gelatina con corpo bianco opaco con scritta "15 mg" e testa trasparente con scritta "TOP".
- Capsula da 25 mg: piccoli granuli biancastri in capsula di gelatina con corpo bianco opaco con scritta "25 mg" e testa trasparente con scritta "TOP".

Flacone opaco in polietilene ad alta densità con chiusura antimanomissione, contenente 20, 28, 60 o 100 capsule con granuli.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore(i)

Janssen-Cilag SpA
Viale Fulvio Testi, 280/6
20126 Milano MI

PRODUTTORE

Capsule rigide

Janssen-Cilag SpA Borgo San Michele – Latina (Italia)

L'autorizzazione per questo prodotto medicinale è stata rilasciata negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con i seguenti nomi:

Austria, Belgio, Cipro, Germania, Italia, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovenia:	Topamax
---	---------

Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia:	Topimax
Francia:	Epitomax
Grecia:	Topamac
Irlanda, Paesi Bassi	Topamax Sprinkle
Spagna:	Topamax Dispersable

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato 03/2024

Altre fonti di informazione

Le ultime informazioni approvate (scheda di allerta paziente, informazioni sul prodotto, materiale educativo) per questo medicinale sono disponibili anche sul seguente sito web (URL):

<https://www.janssenmedicalcloud.it/it-it/neuroscienze/paziente/materiali-educazionali-topiramato>